

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

DSM-DP  
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

# Rapporto 2020 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico*

*caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo problematici,  
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin  
Con la collaborazione di Silvia Marani ed Elsa Turino

**Azienda USL di Bologna  
DSM-DP  
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche**

Via S. Isaia, 94/A  
Tel. 051/6584313  
<http://www.usl.bologna.it/oem>



## *Si ringraziano*

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – Ser. Dp Bologna Ovest, DSM-DP, Ausl Bologna  
Sabrina Canè - AUSL di Bologna – Unità Mobile, DSM -DP, Ausl Bologna  
Giovanni Guescini - U.O.S.D. Ser. Dp Navile Bologna Nord, DSM -DP, Ausl Bologna  
Orietta Venturi – AUSL di Bologna, Equipe Carcere Ser. T Bologna Nord, DSM -DP, Ausl Bologna  
Stefania Bongiovanni e Daniele Campedelli –Ser. Dp Bologna Pianura Ovest, DSM -DP, Ausl Bologna  
Catia Leoni – AUSL di Bologna –Ser. Dp Bologna Est, DSM -DP, Ausl Bologna  
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna –Ser. Dp Budrio, DSM -DP, Ausl Bologna  
Vlamidiro Albertazzi – AUSL di Bologna –Ser. Dp San Lazzaro di Savena, DSM -DP, Ausl Bologna  
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna –Ser. Dp Porretta, DSM -DP, Ausl Bologna  
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna –Ser. Dp Giorgio di Piano, DSM -DP, Ausl Bologna  
Simona Sarti – AUSL di Bologna – Ser. Dp Casalecchio, DSM -DP, Ausl Bologna*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”  
Marco Sirotti – Gruppo Ceis, Casa San Martino e Casa San Matteo  
Manuela Civettini– Opegroup Dipendenze*

*Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio  
Antonietta Moschetti – Policlinico S.Orsola-Malpighi – Equipe servizio ICT  
Gianfranco Preiti, Processo Assistenziale nella Salute Mentale, Resp. Documentazione e Sistemi Informativi nella Salute Mentale, DSM-DP, Ausl Bologna*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell’Osservatorio.  
<http://www.ausl.bologna.it/oem> :

**1 – Dati statistici**  
<https://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici-1>

**2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana**  
<http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi>

## **Cosa emerge**

- Nel corso del 2019 nell'area metropolitana di Bologna si registra un aumento del numero di Consumatori Problematici (CP) di sostanze illegali e di alcol. L'aumento riguarda in modo particolare i residenti e le donne, molti con lavoro stabile e situazione abitativa regolare. Aumenta il numero di overdose letali.
- In aumento il numero di Giocatori Problematici che si rivolgono al SERD.
- Tra i nuovi casi di CP di sostanze illegali (primo contatto in assoluto nel 2019), aumenta rispetto agli anni precedenti il numero dei CP di cocaina e diminuisce il numero dei CP di eroina. Si segnala l'aumento del numero di soggetti con abuso concomitante di alcol e psicofarmaci. Il 55% si era rivolto al Pronto Soccorso (PS) o era stato ricoverato all'Ospedale.
- Tra i nuovi casi di CP di alcol, l'87% si era rivolto ad un PS o era stato ricoverato all'Ospedale.
- Mediamente nei PS vi sono 9.7 accessi per alcol e 3.6 per sostanze illegali al giorno.

## **Cosa succede in città: elementi utili per la progettazione – Periodo 2009/2019**

### **Il consumo problematico di sostanze illegali**

Rispetto agli anni precedenti aumenta il numero di CP di sostanze illegali, che risulta il più elevato degli ultimi 5 anni. Dopo il calo osservato negli anni scorsi, nel 2019 aumentano gli utenti SERD, gli utenti dei Centri di Salute Mentale con diagnosi di disturbo di abuso di sostanze e gli accessi al Pronto Soccorso (PS). Stabili i ricoveri ospedalieri.

Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: rispetto all'anno precedente, mentre rimane stabile l'età media, è in aumento il numero di femmine, di residenti e di non nativi. Si segnala la diminuzione dell'uso di sostanze per via iniettiva e l'aumento del numero di decessi per overdose.

Per quanto riguarda le sostanze, sul totale aumenta il numero dei CP di cocaina e diminuisce il numero dei CP di eroina.

Si segnala l'aumento del numero di CP di eroina, cocaina e cannabis in contatto con i servizi. Tra gli utenti SERD aumenta la quota di positivi all'HIV ed all'Epatite C ed il numero dei soggetti testati. Tra i nuovi utenti SERD sono in aumento i soggetti con occupazione stabile.

### **Il consumo problematico di alcol**

Aumenta il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con CP di alcol. In aumento il numero di accessi ai SERD ed al Pronto Soccorso. Tra i nuovi utenti SERD, in aumento il numero di residenti e di soggetti con una occupazione stabile, in calo il numero di persone senza fissa dimora.

#### **I non nativi**

Il numero di non nativi con CP di alcol e di sostanze illegali è in costante aumento nel tempo. Tali CP non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversi età, sesso e nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Tra i non nativi residenti aumenta l'incidenza di CP di sostanze illegali e rimane stabile l'incidenza di CP di alcol. I tassi più elevati si riscontrano tra i soggetti con età compresa tra 20 e 24 anni.

#### **I residenti**

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di sesso maschile è in aumento l'incidenza di CP di alcol e di sostanze illegali. Pur con valori non elevati, l'incidenza aumenta sia per la cocaina (0.38 per mille residenti nel 2019, 0.31 nel 2018) che per l'eroina (0.18 per mille residenti nel 2019, 0.13 nel 2018).

Sia tra le persone con CP di sostanze illegali che di alcol, l'incidenza è più elevata tra non i nativi rispetto ai nativi. Si segnalano i soggetti con età compresa tra 18 e 19 anni.

#### **I minori**

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in calo l'incidenza del CP di alcol sul totale, tra i maschi, tra i nativi ed i non nativi. Rimane invece invariata tra le femmine.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, diminuisce l'incidenza di CP in entrambi i sessi e indipendentemente dalla provenienza geografica. Relativamente alle singole sostanze, si segnala che non vi sono casi con consumo di eroina e la diminuzione dell'incidenza del CP di cocaina.

### **Il gioco d'azzardo problematico**

Aumenta il numero di soggetti seguiti dai SERD per problemi dovuti al gioco. In aumento la percentuale di femmine e di pensionati. In calo l'età media, la quota di persone con scolarità medio alta e con altre dipendenze.

## 1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti aumenta il numero di CP, sia di eroina, che di cocaina, che di cannabis. Per quanto riguarda le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche, si segnala l'aumento dell'età media, del numero residenti, di femmine e di nuovi contatti Diminuiscono invece i non nativi. Continua ad aumentare il numero di decessi per overdose, che raddoppia rispetto al 2017. Aumentano gli utenti dei SERD (in particolare quelli ristretti in Carcere), della Psichiatria e gli accessi al Pronto Soccorso. Tra i residenti si segnala l'aumento di incidenza e prevalenza. Da rilevare che la prevalenza registra il valore più elevato dal 2009, e che l'incidenza risulta in costante aumento dal 2015.

Tra i nuovi contatti, tra cui solo il 5% utilizzava sostanze per via endovenosa, si segnala l'aumento dell'età media e l'aumento del numero di residenti e di CP di cocaina, stabile il numero di non nativi. Diminuisce il numero di non residenti e, pur su numeri bassi, di persone senza fissa dimora (20 casi).

### I consumatori problematici di sostanze illegali

		2019	2018	2017
<b>Sostanze</b>	Numero	3628	3424	3343
	Oppioidi	2110	2094	2138
	Cocaina	1487	1370	1289
	Cannabis	613	592	570
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi contatti	23.8	22.9	21.7
	Età media	41.2	41.1	40.6
	% femmine	20.7	20.1	19.8
	% non residenti	18.1	21.0	18.6
	% non nativi	21.8	22.1	21.4
<b>Servizi</b>	SERD	2778	2667	2679
	Pronto Soccorso	665	523	482
	Ospedale	314	318	279
	Psichiatria	220	186	191
<b>Dati epidemiologici</b>	Incidenza x 1000 residenti	0.88	0.73	0.71
	Prevalenza x 1000 residenti	4.86	4.46	4.48

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERD, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi; la Psichiatria per l'alta percentuale di soggetti con consumo problematico di Cannabis. I servizi sanitari di emergenza (PS) ed il Carcere, con la loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il CP di sostanze illegali.

### L'accesso ai servizi

		SERD	PS	Ospedale	Psichiatria
<b>Sostanze</b>	Numero	2778	665	314	220
	% Oppioidi	69.3	42.0	28.3	39.5
	% Cocaina	42.3	39.4	31.8	32.3
	% Cannabis	14.2	21.8	23.6	25.5
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi	15.7	41.5	62.1	16.8
	Età media	41.5	38.6	43.4	39.1
	% femmine	18.1	24.8	39.2	26.4
	% non residenti	17.0	23.2	11.1	11.4
	% non nativi	21.3	26.6	24.5	7.7

Per quanto riguarda gli utenti SERD, rispetto al 2018 si segnala l'aumento della quota di positivi all'HIV ed all'epatite C; stabile il numero di pazienti testati.

### Lo stato di salute degli utenti SERD

% positivi	HIV	Epatite C	% con almeno un test		
	2019	2018	2019	2018	2017
	7.8	43.1		73.9	74.8
	6.2	34.9		74.1	75.7
	8.8	46.9		74.7	72.1

## 2 - Il consumo problematico di alcol

### Consumo problematico di alcol: dati epidemiologici

		2019	2018	2017
	Numero soggetti	2902	2799	2723
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi contatti	40.4	40.9	40.4
	Età media	49.5	49.6	49.1
	% femmine	26.9	26.6	26.5
	% non residenti	14.6	16.6	15.4
	% non nativi	24.5	24.8	25.0
<b>Servizi</b>	SERD	1276	1229	1184
	Pronto Soccorso	1330	1355	1220
	Ospedale	569	577	600
	Psichiatria	229	224	224
<b>Dati epidemiologici</b>	Incidenza x 1000 residenti	1.14	1.08	1.04
	Prevalenza x 1000 residenti	3.40	3.23	3.13

Rispetto agli anni precedenti aumenta il numero complessivo di persone con CP di alcol. Mentre cala il numero di non residenti, l'aumento coinvolge diverse tipologie di soggetti (maschi, femmine, nativi, non nativi e residenti). Aumentano in modo particolare gli alcolisti seguiti dal SERD, tra cui anche i soggetti ristretti in Carcere. L'incremento del numero di soggetti con problemi alcol correlati si conferma anche utilizzando i dati relativi ai residenti, aumentano infatti sia l'incidenza che la prevalenza. Da segnalare l'aumento del numero di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali (21%) e di psicofarmaci (5%).

## 3 – I non nativi

I non nativi con CP di alcol e di sostanze illegali sono in costante aumento, ma non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea, per le sostanze illegali la graduatoria si inverte, con i soggetti nativi di paesi dell'Africa mediterranea al primo posto seguiti da quelli di paesi dell'Europa dell'Est. Di rilievo, anche se su una base eterogenea, l'aumento della quota di soggetti provenienti da altri paesi africani, sia per l'alcol che per le sostanze illegali.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, il 50% ha un consumo problematico dovuto ad uso oppioidi (in diminuzione), il 52% dovuto ad uso di cocaina (in aumento).

Zona di provenienza	Sostanze illegali		Alcol	
	2019	2018	2019	2018
<b>Totale</b>	791	754	711	694
% Europa Est	24.9	26.5	43.9	43.7
% Altri paesi europei	9.7	8.6	8.3	8.4
% Asia	8.7	9.0	8.6	9.4
% Africa Mediterranea	42.7	44.0	24.3	22.2
% Altra Africa	6.3	5.2	8.2	7.9
% America Latina	6.8	6.2	5.9	7.3

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con CP di sostanze illegali si rivolge al SERD, in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha un CP di alcol si rivolge maggiormente al Pronto Soccorso.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2019	2018	2019	2018
% Ospedale	9.7	8.8	15.3	17.1
% Pronto soccorso	22.4	19.6	57.7	61.1
% Psichiatria	2.1	2.5	4.4	5.5
% SERD	75.0	75.3	38.5	37.9
% di cui anche Carcere	32.2	35.3	6.6	5.8
% di cui anche Unità Mobile Metadone	10.9	13.0	2.4	2.9

#### 4 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di entrambi i sessi e tra i residenti non nativi, è in aumento l'incidenza di CP sia di alcol che di sostanze illegali.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Illegali		Alcol		Illegali	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
2019	1.65	0.65	1.34	0.44	0.97	2.15	0.78	1.47
2018	1.59	0.59	1.14	0.33	0.89	2.18	0.66	1.14
2017	1.47	0.62	1.12	0.30	0.86	2.05	0.68	0.89
2016	1.39	0.65	1.07	0.40	0.83	2.09	0.66	1.13
2015	1.70	0.62	1.14	0.30	1.01	2.00	0.67	0.98
2014	2.27	0.99	1.27	0.52	1.35	3.19	0.84	1.22
2013	1.97	0.81	1.36	0.58	1.15	2.73	0.92	1.28
2012	2.05	0.80	1.17	0.38	1.12	3.25	0.71	1.15
2011	2.17	0.72	1.31	0.45	1.19	3.08	0.84	1.16
2010	1.91	0.69	1.27	0.49	1.07	2.93	0.83	1.26
2009	1.62	0.55	1.15	0.41	0.90	2.55	0.74	1.10

Tra le persone con CP di sostanze illegali, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi e tra i maschi. Per quanto riguarda le fasce di età, è più elevata tra i maschi di età compresa tra 18 e 39 anni, con il picco nella classe 20-24 anni. Tra le femmine si segnalano le CP di 18/19 anni. Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età compresa tra 18 e 34 anni.

Da rilevare che l'incidenza è sempre più elevata tra i maschi rispetto alle femmine in tutte le classi di età; risulta invece più elevata per i non nativi in tutte le classi di età, esclusa la fascia 18-19 anni, dove è più elevata tra i nativi.

Sostanze illegali: incidenza per mille residenti per età	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi
12-17	0.51	0.36	0.40	0.69
18-19	2.12	1.51	1.89	1.45
20-24	2.72	0.68	1.49	2.93
25-29	2.21	0.62	1.28	1.92
30-34	2.36	0.88	1.42	2.17
35-39	2.02	0.50	1.18	1.54
40-44	1.33	0.45	0.87	0.96
45-49	1.12	0.13	0.52	1.33
50-54	0.76	0.43	0.51	1.38
55-59	0.62	0.21	0.42	0.35
60-64	0.31	0.14	0.20	0.47

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età, escluso tra i minori di 20 anni, dove prevalgono i nativi. Tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 18 e 19 anni, tra i non nativi nelle fasce comprese tra 20-24 anni e 45-59 anni.

Per quanto riguarda il sesso, l'incidenza risulta più elevata tra i maschi in tutte le classi di età, esclusi i minorenni, dove prevalgono invece le femmine. Si segnalano le classi di età 20-24 anni tra i maschi e 18-19 anni tra le femmine, dove osserviamo i valori più elevati.

Alcol: incidenza per mille residenti per età	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi
12-17	0.38	0.59	0.50	0.34
18-19	1.99	1.24	1.74	0.96
20-24	2.05	0.73	1.10	2.93
25-29	1.75	0.62	0.96	2.03
30-34	1.95	0.52	0.81	2.49
35-39	1.74	0.60	0.83	2.31
40-44	1.75	0.63	0.92	2.44
45-49	1.70	0.72	0.98	2.78
50-54	1.64	0.76	1.11	1.94
55-59	1.81	0.64	1.17	1.56
60-64	1.58	0.45	0.91	1.89

## 5 – Gli accessi al pronto soccorso

Sostanze illegali		Alcol			
	2019	2009			
<b>Numero accessi</b>	1318	653	<b>Numero accessi</b>	3548	2542
<b>Età media</b>	35.6	36.4	<b>Età media</b>	45.5	41.7
<b>% Femmine</b>	13.9	8.7	<b>% Femmine</b>	17.6	17.9
<b>% Non nativi</b>	19.8	7.8	<b>% Non nativi</b>	18.6	20.5
<b>% Non residenti</b>	23.0	13.2	<b>% Non residenti</b>	18.0	22.7
<b>% Anche alcol</b>	27.1	16.1	<b>% anche sostanze illegali</b>	9.0	11.0
<b>% Oppioidi</b>	18.1	50.1			
<b>% Cocaina</b>	40.8	17.2			
<b>% Cannabis</b>	23.0	12.3			

Il numero di soggetti che accedono ai PS per CP di sostanze illegali è in costante aumento rispetto al 2009. Mentre l'età media è in calo, aumentano la percentuale di femmine, di non residenti di non nativi. Diminuisce drasticamente la quota di accessi per CP di oppioidi, aumenta invece per CP di cannabis e cocaina e per abuso concomitante di alcol.

Aumentano il numero di CP di alcol, la loro età media ed il numero di residenti. In calo la percentuale di non nativi, di non residenti e di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali. Stabile la quota di femmine.

## 6 – I ricoveri ospedalieri

Sostanze illegali		Alcol			
	2019	2009			
<b>Numero ricoveri</b>	450	467	<b>Numero ricoveri</b>	832	1043
<b>% Dipendenza droghe</b>	23.5	21.2	<b>% Danni epatici</b>	55.6	18.3
<b>% Abuso droghe senza dipendenza</b>	50.8	32.7			
<b>Età media</b>	42.8	47.2	<b>Età media</b>	55.5	55.9
<b>% Femmine</b>	37.3	53.5	<b>% Femmine</b>	27.0	24.0
<b>% Non nativi</b>	22.7	10.9	<b>% Non nativi</b>	19.9	11.4
<b>% Non residenti</b>	8.9	8.6	<b>% Non residenti</b>	7.1	8.4
<b>% Oppioidi</b>	15.4	20.0			
<b>% Cocaina</b>	21.2	6.3			
<b>% Cannabis</b>	16.3	5.3			

Rispetto al 2009 rimane stabile il numero di ricoveri per abuso/dipendenza da sostanze illegali. Si segnala la diminuzione dell'età media e della quota di femmine, stabili i non residenti, in aumento i non nativi. Si segnala l'aumento dei ricoveri per abuso di droghe senza dipendenza. Per quanto riguarda le sostanze, diminuisce la quota di CP di oppioidi, che invece aumenta per cannabis e cocaina.

Il numero di ricoveri per problemi alcol correlati è diminuzione. Mentre l'età media al ricovero è stabile, aumenta nel tempo la percentuale di femmine e di non nativi. Si segnala l'aumento del numero di ricoveri per danni epatici.

## 7 – I nuovi utenti dei SERD

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di sostanze illegali è in aumento rispetto al 2018. Aumentano l'età media, i non nativi ed i residenti. In calo non residenti e soggetti senza fissa dimora.

Per quanto riguarda le sostanze di abuso, si segnala il consistente aumento del numero di CP di cocaina ed il costante calo dei CP di eroina.

Per quanto riguarda la fonte del primo contatto, si segnala il carcere (26%). In aumento il numero di persone con lavoro stabile. Si segnalano 4 casi di utenti positivi all'HIV e 17 casi di positivi all'epatite C.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2019	2018	2019	2018
<b>Numero soggetti</b>	435	396	270	254
<b>Età media</b>	34.3	33.3	44.2	45.9
<b>% Femmine</b>	15.2	13.1	25.2	28.7
<b>% Non nativi</b>	33.8	35.6	31.9	32.7
<b>% Non residenti</b>	31.0	36.6	14.1	12.6
<b>% Dimora stabile</b>	45.5	59.3	79.5	84.3
<b>% Occupati</b>	40.7	35.4	53.0	49.6
<b>% Oppioidi</b>	32.2	40.9		
<b>% Cocaina</b>	60.5	60.1		

Il numero di nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol è in aumento rispetto al 2018, ed è il più elevato a partire dal 2009. Diminuiscono l'età media, aumentano il numero di non nativi e di non residenti, stabile il numero di soggetti senza fissa dimora (7 casi). Si segnala l'aumento del numero di soggetti che provengono dal Carcere (14%). In aumento il numero di soggetti con abitazione stabile ed occupati.

## 8 – I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in calo l'incidenza (nuovi casi su 1000 residenti) del CP di alcol sul totale, tra i maschi, tra i nativi e tra i non nativi. Rimane invece costante tra le femmine.

**Alcol: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale</b>	0.48	0.62	0.61	0.46	1.00	0.93	0.83	0.63	0.83	0.80	0.38
<b>Maschi</b>	0.38	0.64	0.61	0.45	1.17	1.11	1.00	0.74	1.15	0.98	0.58
<b>Femmine</b>	0.59	0.59	0.60	0.47	0.82	0.74	0.66	0.52	0.49	0.60	0.17
<b>Nativi</b>	0.50	0.63	0.54	0.48	0.84	0.97	0.82	0.58	0.80	0.66	0.34
<b>Non nativi</b>	0.34	0.53	1.07	0.35	2.07	0.68	0.88	0.93	1.02	1.78	0.75

Per quanto riguarda le sostanze illegali, diminuisce l'incidenza di CP in entrambi i sessi e indipendentemente dalla provenienza geografica.

Relativamente alle singole sostanze, si segnala che non vi sono casi con consumo di eroina e la diminuzione dell'incidenza del CP di cocaina.

### Sostanze illegali: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	0.44	0.77	0.52	0.64	0.42	0.45	0.46	0.38	0.42	0.29	0.41
Maschi	0.51	0.81	0.70	0.85	0.63	0.69	0.52	0.59	0.70	0.26	0.42
Femmine	0.36	0.73	0.32	0.43	0.19	0.20	0.40	0.16	0.11	0.33	0.39
Nativi	0.40	0.66	0.51	0.53	0.38	0.39	0.43	0.17	0.39	0.27	0.40
Non nativi	0.69	1.58	0.53	1.41	0.69	0.85	0.70	1.68	0.61	0.45	0.50
Eroina	-	0.07	0.02	0.11	0.07	0.02	0.07	-	0.03	-	0.08
Cocaina	0.02	0.13	-	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-

### 9 – Il sistema di allerta rapida droghe/alcol

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2019, rispetto all'anno precedente, aumenta il numero di decessi per overdose, che raddoppia rispetto al 2017. Da segnalare che è il dato più elevato a partire dal 2014. Dopo il trend in diminuzione dal 2012, nel 2019 aumenta il numero di accessi ai PS per overdose non letali. In calo l'età media sia per i decessi che per gli accessi ai PS. Tra i decessi, si segnala l'aumento dei residenti (69%), dei non nativi (33%) e delle persone che non si erano mai rivolte al SERT (44%)

	Il sistema di allerta rapida*	
	Decessi per overdose	
	Numero	Età media
2012	16	36.9
2013	23	40.0
2014	13	39.0
2015	17	40.6
2016	17	40.7
2017	11	42.4
2018	20	45.3
2019	23	40.3
	Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media
	113	36.3
2012	113	36.3
2013	112	37.9
2014	98	38.0
2015	86	38.2
2016	85	37.9
2017	69	36.4
2018	50	40.2
2019	68	38.3

\* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

Pur con andamento altalenante, nei PS dell'Area Metropolitana di Bologna vi sono circa 2000 accessi per intossicazioni alcoliche acute ogni anno, in aumento rispetto all'anno precedente. L'età media è di 42 anni, la classe di età compresa tra 40 e 49 anni è la più rappresentata. Aumentano i non residenti, in calo la quota di femmine e di non nativi.

Il 65% degli accessi avviene di notte e la metà nel fine settimana (entrambi i dati in aumento). Nell'11% dei casi si osserva abuso concomitante di sostanze illegali, dato in aumento.


### Accessi ai PS per intossicazione alcolica acuta\*

	Numero	Età media	% Femmine	% Non nativi	% Non residenti
2012	1983	40.8	25.0	40.4	38.3
2013	2000	39.4	26.1	39.6	39.1
2014	2538	41.8	28.1	42.5	37.8
2015	1602	41.8	28.3	35.8	32.2
2016	1919	43.3	29.7	37.9	32.9
2017	1729	41.0	28.7	44.9	42.7
2018	1971	41.7	27.9	41.1	35.9
2019	2188	42.0	26.8	40.1	37.2

\* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

### 10 – Il gioco d'azzardo problematico

Considerando i soggetti che si sono rivolti ai SERD, agli ospedali ed ai servizi della psichiatria, il numero dei nuovi casi di gioco problematico aumenta nel 2019 (104 nuovi casi).



Tra gli utenti dei SERD, aumenta il numero di persone prese in carico (233 utenti nel 2019, 186 nel 2018) e la percentuale di femmine (21%) e di pensionati (22%). In calo l'età media (47 anni), la quota di non nativi (7%), di non residenti (5%), di soggetti con scolarità medio alta (34%) e con altre dipendenze (2%).

## Anno 2019 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2019
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2019
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2019
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2019
Tab. 6	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2019
Tab. 7	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019
Tab. 8	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019
Tab. 9	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019
Tab. 10	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019
Tab. 11	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019
Tab. 12	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019
Tab. 13	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019
Tab. 14	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019
Tab. 15	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019
Tab. 16	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019
Tab. 17	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019
Tab. 18	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019
Tab. 19	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019
Tab. 20	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019
Tab. 21	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2019
Tab. 22	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019
Tab. 23	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2019
Tab. 24	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2019
Tab. 25	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2019
Tab. 26	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2019
Tab. 27	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019
Tab. 28	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019
Tab. 29	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019
Tab. 30	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019
Tab. 31	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019
Tab. 32	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019
Tab. 33	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019
Tab. 34	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019
Tab. 35	Gioco problematico. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2019
Tab. 36	Gioco problematico. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2019
Tab. 37	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2019
Tab. 38	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2019
Tab. 39	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2019.
Tab. 40	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2019.
Tab. 41	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2019
Tab. 42	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2019
Tab. 43	Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2019
Tab. 44	Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2019.

**Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale</b>	3628	3414	3343	3526	3544	3696	3781	3791	3845	3898	3809
nuovi contatti	23.8	22.9	21.7	23.3	21.2	25.9	27.1	23.8	24.7	26.7	24.5
età media	41.2	41.1	40.6	40.4	39.8	40.1	39.7	38.8	38.9	37.7	37.1
maschi	79.3	79.9	80.2	79.2	80.4	79.0	78.3	79.6	79.2	78.7	79.2
femmine	20.7	20.1	19.8	20.8	19.6	21.0	21.7	20.4	20.8	21.3	20.8
nativi	78.0	77.7	78.2	77.6	77.4	77.7	78.8	79.1	80.2	80.4	81.7
non nativi	21.8	22.1	21.4	22.1	22.5	22.1	21.0	20.9	19.8	19.6	18.3
residenti area metropolitana	79.4	76.9	78.2	73.5	75.1	74.6	73.1	71.1	72.0	113.1	70.1
residenti fuori area metropolitana	18.2	21.0	18.6	24.2	23.4	23.6	25.2	27.8	27.9	35.9	29.7
senza fissa dimora (SFD)	4.8	5.5	5.6	5.0	4.9	5.3	4.5	3.7	3.4	5.7	5.4
decesso overdose	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2
oppiodi	58.2	61.3	64.0	64.7	68.2	70.3	66.0	75.9	78.5	73.7	76.7
di cui eroina	54.3	58.2	60.4	61.0	64.8	63.9	62.5	68.6	68.3	70.1	71.3
cocaina	41.0	40.1	38.6	31.8	30.8	27.9	24.7	29.4	26.6	24.5	33.7
di cui solo cocaina	23.5	21.9	20.9	17.7	16.2	14.5	13.7	10.6	9.7	12.2	10.3
cannabinoidi	16.9	17.3	17.1	16.5	14.4	14.4	14.0	15.1	12.3	10.3	14.7
di cui solo cannabinoidi	7.8	7.7	7.2	6.2	6.4	6.4	6.5	5.2	4.1	4.0	3.6
altre sostanze illegali	12.1	12.2	12.3	12.8	11.8	14.0	10.2	14.7	12.4	11.6	14.0
di cui allucinogeni	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.2	0.3
di cui amfetamine	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
di cui crack	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	0.3	0.4
di cui ecstasy	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
di cui GHB	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui ketamina	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
di cui altra non indicata	10.7	11.0	11.0	12.7	6.5	13.1	6.0	6.6	10.8	9.1	7.8
abuso concomitante di psicofarmaci**	6.2	5.4	4.2	7.0	5.5	6.4	10.1	5.4	5.8	7.8	8.2
di cui benzodiazepine	4.6	3.7	2.7	4.3	3.4	4.0	8.8	4.0	3.1	3.0	4.1
di cui antidepressivi	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	1.3	1.0	1.8	0.4
di cui barbiturici	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.5	0.3	0.4
di cui psicofarmaci	3.0	1.6	1.9	2.6	1.9	2.7	1.2	3.2	2.3	2.2	1.9
anche alcol	16.9	16.3	15.9	15.8	15.0	15.2	13.5	22.2	20.2	24.8	27.2
uso di una qualsiasi sostanza via vena	25.6	27.8	29.3	30.0	31.5	31.0	31.2	33.1	35.4	37.8	36.0
Ospedale	8.7	9.3	8.3	8.1	8.1	8.4	6.4	6.5	6.8	8.4	5.6
Psichiatria	6.1	5.4	5.7	5.4	7.7	7.0	3.4	2.9	2.3	2.1	2.0
Pronto soccorso	18.3	15.3	14.4	13.8	11.1	16.5	17.5	16.7	12.7	10.4	12.3
SERT	76.6	78.1	80.0	78.6	80.5	77.5	75.9	77.4	78.9	81.8	79.4
di cui anche Carcere	12.6	13.4	14.5	14.9	17.2	17.3	16.6	18.4	18.0	16.8	13.7
di cui anche Unità Mobile Metadone	3.8	4.5	4.3	4.2	4.9	4.9	3.5	3.7	3.8	5.0	4.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	863	781	727	821	750	957	1026	902	950	1042	935
età media	36.9	35.8	35.7	36.9	36.9	38.9	38.8	34.9	36.4	36.2	35.2
maschi	76.2	78.1	81.0	77.0	79.1	72.8	71.0	80.0	76.6	75.3	77.6
femmine	23.8	21.9	19.0	23.0	20.9	27.2	29.0	20.0	23.4	24.7	22.4
nativi	69.2	65.9	66.0	62.2	68.4	69.9	72.0	66.4	70.0	69.5	73.7
non nativi	30.5	33.4	33.4	37.1	31.5	29.4	27.8	33.5	30.0	30.5	26.3
residenti area metropolitana	64.2	58.9	59.7	55.7	60.3	62.6	65.1	51.6	57.2	53.1	51.7
residenti fuori area metropolitana	32.4	38.3	36.9	39.5	37.7	34.7	32.4	46.6	42.7	43.6	48.0
senza fissa dimora (SFD)	2.3	4.2	3.9	5.2	4.4	5.4	3.1	3.7	1.8	6.8	4.7
decesso overdose	1.5	1.7	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.3	0.4	0.2	0.3
oppiodi	24.8	26.0	30.4	33.1	38.0	45.9	28.2	44.6	48.9	48.6	52.6
di cui eroina	15.9	20.7	25.0	25.3	30.4	29.4	21.6	37.7	36.0	42.6	45.0
cocaina	41.7	43.8	46.1	34.8	35.1	27.4	23.4	26.3	24.8	21.8	29.8
di cui solo cocaina	33.4	32.9	34.1	25.6	24.8	19.0	17.3	17.7	16.9	15.1	14.1
cannabinoidi	24.7	29.4	32.0	25.5	23.1	23.2	24.5	22.4	15.6	11.5	15.7
di cui solo cannabinoidi	16.3	19.0	18.4	12.9	14.4	13.9	15.7	14.1	10.6	7.7	5.9
altre sostanze illegali	23.2	20.7	19.3	25.5	21.2	25.3	19.2	26.8	28.3	29.8	29.9
di cui allucinogeni	0.9	0.5	0.4	0.2	1.1	0.3	0.5	0.9	1.7	0.0	0.4
di cui amfetamine	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	0.4	1.2	0.9	0.9
di cui crack	1.4	1.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.2
di cui ecstasy	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2
di cui GHB	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui ketamina	0.5	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.6
di cui altra non indicata	20.3	18.7	17.3	23.9	16.7	23.7	15.7	19.3	25.2	27.9	22.4
abuso concomitante di psicofarmaci**	10.5	10.1	6.7	11.1	9.7	11.1	25.4	7.6	6.8	16.1	10.4
di cui benzodiazepine	8.3	7.3	3.9	6.9	6.1	6.6	23.0	2.9	2.3	4.1	3.4
di cui antidepressivi	0.8	0.8	0.3	0.7	0.3	0.5	2.3	1.2	1.3	5.8	0.1
di cui barbiturici	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	1.0	0.4	0.6	1.3	0.2	0.1
di cui psicofarmaci	6.6	2.4	3.7	3.9	2.9	5.2	2.0	4.0	3.6	5.0	2.4
anche alcol	18.4	16.9	18.0	16.8	16.3	16.5	13.9	20.3	18.9	14.9	20.4
uso di una qualsiasi sostanza via vena	4.9	6.4	8.1	5.7	7.2	8.8	5.8	13.2	12.0	14.4	11.0
Ospedale	22.6	19.1	17.5	16.6	21.2	18.8	11.0	10.3	15.8	21.3	10.8
Psichiatria	4.3	3.6	0.0	3.0	4.0	9.2	3.0	2.5	1.3	1.6	1.7
Pronto soccorso	32.0	33.5	35.1	31.5	24.9	34.2	33.5	35.7	25.4	22.3	29.6
SERT	43.5	46.9	52.7	49.3	52.3	42.6	37.2	49.8	53.2	56.5	49.1
di cui anche Carcere	13.7	15.2	20.1	20.7	17.5	13.8	14.0	24.8	22.8	20.9	21.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	2.7	4.4	4.7	4.4	6.0	6.9	3.4	4.2	3.4	7.2	3.5

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	791	754	716	779	797	815	795	793	763	765	696
nuovi contatti	33.2	34.6	33.9	39.2	29.6	34.5	35.8	38.1	37.4	41.6	35.3
età media	35.7	34.7	34.8	34.9	34.6	33.7	33.9	33.2	33.2	32.7	32.2
maschi	86.9	86.9	87.8	86.1	89.7	90.1	89.3	91.0	88.5	88.2	89.1
femmine	13.1	13.1	12.2	13.9	10.3	9.9	10.7	9.0	11.5	11.8	10.9
residenti area metropolitana	51.2	44.7	43.2	39.2	38.3	36.0	35.6	33.0	34.6	34.0	35.9
residenti fuori area metropolitana	42.2	48.7	47.2	53.8	56.8	58.2	58.5	63.2	65.3	59.9	63.8
senza fissa dimora (SFD)	11.9	12.6	13.0	12.7	9.0	12.0	9.1	6.6	7.5	9.2	8.8
decesso overdose	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0

oppiodi	49.6	51.9	54.5	57.9	63.2	65.0	62.3	68.0	73.1	71.1	73.6
di cui eroina	45.1	48.1	51.0	53.5	59.8	60.2	58.5	62.9	64.7	67.8	68.5
cocaina	51.5	50.9	49.7	40.9	39.5	36.6	31.3	33.2	28.2	27.7	45.8
di cui solo cocaina	31.6	28.9	28.2	23.1	20.3	19.1	17.5	15.8	12.7	14.6	14.2
cannabinoidi	24.0	25.2	23.3	21.8	18.3	21.5	20.0	17.2	12.2	10.2	18.1
di cui solo cannabinoidi	10.4	10.2	8.9	6.5	7.2	7.4	7.8	7.4	5.6	3.7	3.2
altre sostanze illegali	11.1	12.5	13.1	12.5	10.5	11.7	9.9	12.9	11.1	11.1	13.9
abuso concomitante di psicofarmaci*	6.2	4.6	3.8	5.5	4.8	6.0	7.3	3.9	4.6	5.5	8.2
di cui benzodiazepine	3.8	2.3	2.2	3.3	2.6	4.2	6.0	2.5	2.4	1.8	4.0
anche alcol	17.7	16.0	15.9	15.1	12.7	13.1	12.1	19.2	14.2	18.6	22.8
uso di una qualsiasi sostanza via vena	11.1	12.3	12.6	12.8	14.4	14.4	14.5	14.8	16.5	17.3	14.4

Ospedale	9.7	8.8	5.9	5.1	6.3	5.8	5.2	4.7	5.2	5.6	3.7
Psichiatria	2.1	2.5	2.4	2.3	3.0	2.2	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6
Pronto soccorso	22.4	19.6	18.2	18.1	12.9	15.6	17.4	15.4	11.0	14.0	12.2
SERT	75.0	75.3	79.5	77.4	80.2	80.9	78.0	78.4	81.0	81.4	77.4
di cui anche Carcere	32.2	35.3	39.1	40.3	46.2	49.7	48.1	53.5	51.4	48.2	49.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	10.9	13.0	13.0	13.0	13.9	14.7	10.1	9.7	11.1	13.7	11.6

Area provenienza											
Europa Est	24.9	26.5	23.0	22.5	21.7	20.4	18.7	18.7	19.0	19.5	19.4
Altri paesi europei	9.7	8.6	9.2	8.9	9.0	9.1	11.7	10.5	11.1	13.5	13.6
Africa Mediterranea	42.7	44.0	49.4	52.2	53.8	55.2	55.0	56.0	55.3	54.5	53.4
Altra Africa	6.3	5.2	4.3	3.2	3.5	2.7	3.3	2.5	3.7	2.7	3.3
Asia	8.7	9.0	8.7	7.7	7.7	7.6	6.2	6.8	6.0	5.4	5.2
America Latina	6.8	6.2	5.3	5.1	4.1	4.8	3.8	3.5	3.9	3.8	4.0
USA e Canada	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
Altro	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	1.6	0.4	0.3	0.3

Nazione											
Marocco	21.4	21.4	22.6	21.7	21.0	20.0	21.0	22.4	21.8	22.1	21.0
Tunisia	16.6	17.9	21.4	25.8	26.2	28.3	26.3	25.6	24.0	22.0	20.1
Albania	4.8	5.4	3.5	3.6	3.4	3.9	4.2	3.3	2.5	4.1	3.9
Romania	4.7	5.6	4.5	5.4	4.9	5.8	4.3	5.0	4.6	3.8	3.0
Algeria	4.0	4.5	4.9	4.2	6.1	6.3	7.0	7.3	8.9	9.9	11.9

\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	263	261	243	305	236	281	285	302	285	318	246
età media	33.1	30.7	31.4	32.5	32.5	30.0	31.6	31.1	31.1	31.3	30.4
maschi	85.6	87.0	88.5	86.2	90.3	85.8	84.9	90.1	82.8	86.5	87.8
femmine	14.4	13.0	11.5	13.8	9.7	14.2	15.1	9.9	17.2	13.5	12.2
residenti area metropolitana	49.0	37.9	31.7	32.1	35.6	35.6	37.5	30.8	31.6	28.0	28.5
residenti fuori area metropolitana	46.8	55.6	62.6	59.3	60.2	58.7	55.8	65.2	68.4	63.8	71.1
senza fissa dimora (SFD)	6.8	10.0	6.2	12.1	6.8	12.5	7.4	4.3	3.9	11.0	7.3
decesso overdose	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	1.7	0.4	0.0	0.0

oppiodi	27.4	30.3	33.7	40.0	45.8	48.0	40.4	49.3	55.1	60.7	59.3
di cui eroina	20.2	25.7	30.9	34.4	40.7	40.6	34.0	44.4	43.5	55.7	53.7
cocaina	47.9	51.7	52.3	44.3	40.3	33.1	28.4	28.8	24.2	18.6	37.0
di cui solo cocaina	37.6	36.8	35.4	29.5	22.0	19.9	18.6	20.9	17.2	13.5	17.5
cannabinoidi	29.7	32.6	34.6	31.5	24.6	30.2	28.1	23.2	14.7	7.5	18.7
di cui solo cannabinoidi	18.6	17.6	16.5	12.5	13.6	13.5	13.0	12.3	10.2	5.3	3.3
altre sostanze illegali	17.1	16.5	15.6	17.0	19.1	22.4	18.9	20.2	20.4	20.4	22.8
abuso concomitante di psicofarmaci**	8.4	6.5	4.9	6.2	5.5	7.8	13.3	4.6	4.6	6.6	7.7
di cui benzodiazepine	6.1	3.1	2.9	3.9	1.7	5.0	11.6	1.0	1.8	1.6	2.8
anche alcol	20.5	18.4	16.9	15.4	14.0	13.9	15.1	20.9	14.4	12.3	17.9
uso di una qualsiasi sostanza via vena	3.0	6.5	7.0	4.9	6.8	8.5	4.6	11.3	8.8	10.4	7.7

Ospedale	17.9	13.0	8.6	6.6	12.7	11.0	6.3	5.6	10.5	8.5	6.1
Psichiatria	0.8	1.5	0.0	2.6	1.7	5.0	0.7	1.7	0.0	0.6	0.4
Pronto soccorso	34.6	36.4	32.5	29.2	26.7	29.2	34.4	28.8	21.1	23.6	26.4
SERT	52.1	52.5	60.9	63.9	58.1	59.1	51.9	60.6	64.6	67.9	60.6
di cui anche Carcere	27.0	29.1	41.2	39.3	33.5	33.8	33.3	47.7	48.1	45.3	47.6
di cui anche Unità Mobile Metadone	6.1	10.0	7.4	8.5	12.3	14.6	8.1	6.0	6.7	13.2	6.5

Area provenienza											
Europa Est	25.9	30.3	24.3	21.0	21.6	23.5	21.8	20.9	20.4	22.0	21.5
Altri paesi europei	9.1	5.4	5.3	4.6	6.4	3.9	7.4	7.6	6.0	8.2	8.9
Africa Mediterranea	38.4	40.6	50.6	55.4	52.5	54.8	54.4	54.0	58.2	56.3	52.0
Altra Africa	11.0	7.3	7.0	4.3	5.9	2.5	5.3	2.3	4.9	4.1	4.5
Asia	8.0	9.6	9.5	9.8	10.2	10.3	5.3	7.6	5.6	6.0	6.5
America Latina	5.7	5.7	3.3	4.3	3.4	5.0	4.2	3.6	3.5	0.0	5.3
USA e Canada	1.5	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.3	0.4	3.1	0.8
Altro	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	1.1	0.3	0.4

Nazione											
Marocco	22.4	23.4	28.8	25.2	22.9	21.7	23.9	20.2	24.9	22.0	23.2
Tunisia	12.5	14.9	16.5	27.2	27.5	29.5	25.6	29.1	26.3	26.7	18.3
Albania	6.5	8.4	2.9	5.6	4.7	3.2	5.3	4.6	1.8	5.3	5.3
Romania	6.5	7.7	7.4	6.6	4.2	11.7	7.4	8.6	7.4	6.6	3.7

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 5 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totalle	31	43	42	45	25	26	23	20	21	15	18
nuovi contatti	80.6	90.7	69.0	77.8	80.0	84.6	95.7	100.0	95.2	100.0	94.4
età media	16.1	16.3	16.3	16.1	16.1	16.3	16.2	15.8	16.4	16.1	16.2
maschi	67.7	55.8	69.0	75.6	84.0	88.5	60.9	85.0	85.7	60.0	44.4
femmine	32.3	44.2	31.0	24.4	16.0	11.5	39.1	15.0	14.3	40.0	55.6
nativi	67.7	67.4	76.2	71.1	76.0	69.2	78.3	45.0	71.4	80.0	88.9
non nativi	32.3	32.6	23.8	28.9	24.0	30.8	21.7	55.0	28.6	20.0	11.1
residenti area metropolitana	87.1	90.7	81.0	80.0	84.0	88.5	87.0	75.0	81.0	73.3	88.9
residenti fuori area metropolitana	12.9	7.0	16.7	15.6	16.0	11.5	13.0	15.0	19.0	26.7	11.1
senza fissa dimora (SFD)	0.0	2.3	2.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
oppiodi	6.5	16.3	16.7	17.8	16.0	11.5	13.0	5.0	9.5	20.0	22.2
di cui eroina	3.2	11.6	14.3	17.8	16.0	7.7	4.3	5.0	9.5	13.3	22.2
cocaina	9.7	20.9	9.5	20.0	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
di cui solo cocaina	9.7	18.6	7.1	20.0	8.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
cannabinoidi	74.2	74.4	66.7	57.8	72.0	69.2	52.2	60.0	66.7	46.7	50.0
di cui solo cannabinoidi	64.5	53.5	61.9	40.0	60.0	57.7	47.8	60.0	66.7	40.0	38.9
altre sostanze illegali	19.4	14.0	23.8	24.4	20.0	42.3	26.1	40.0	19.0	40.0	44.4
abuso concomitante di psicofarmaci*	6.5	4.7	4.8	2.2	8.0	3.8	17.4	0.0	4.8	20.0	0.0
di cui benzodiazepine	3.2	2.3	0.0	2.2	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	6.7	0.0
anche alcol	12.9	14.0	14.3	11.1	24.0	19.2	17.4	25.0	28.6	13.3	5.6
uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7	0.0
Ospedale	9.7	18.6	11.9	6.7	8.0	19.2	21.7	0.0	4.8	13.3	16.7
Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pronto soccorso	61.3	58.1	54.8	31.1	44.0	46.2	47.8	75.0	52.4	46.7	66.7
SERT	35.5	34.9	42.9	66.7	60.0	38.5	26.1	25.0	47.6	46.7	27.8
di cui anche Carcere Minorile	0.0	7.0	7.1	13.3	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 6 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni.  
Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	25	39	29	35	20	22	22	20	20	15	17
età media	15,9	16,3	16,1	16,1	16,0	16,4	16,3	15,8	16,4	16,1	16,2
maschi	64,0	56,4	75,9	82,9	80,0	86,4	59,1	85,0	85,0	60,0	47,1
femmine	36,0	43,6	24,1	17,1	20,0	13,6	40,9	15,0	15,0	40,0	52,9
nativi	72,0	69,2	75,9	68,6	80,0	63,6	77,3	45,0	70,0	80,0	88,2
non nativi	28,0	30,8	24,1	31,4	20,0	36,4	22,7	55,0	30,0	20,0	11,8
residenti area metropolitana	84,0	89,7	79,3	80,0	85,0	86,4	86,4	75,0	80,0	73,3	88,2
residenti fuori area metropolitana	16,0	7,7	17,2	14,3	15,0	13,6	13,6	15,0	20,0	26,7	11,8
senza fissa dimora (SFD)	0,0	2,6	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
decesso overdose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

oppiodi	4,0	10,3	6,9	14,3	15,0	9,1	13,6	5,0	10,0	20,0	17,6
di cui eroina	0,0	5,1	3,4	14,3	15,0	4,5	4,5	5,0	10,0	13,3	17,6
cocaina	4,0	20,5	6,9	17,1	5,0	9,1	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
di cui solo cocaina	4,0	20,5	3,4	17,1	0,0	9,1	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
cannabinoidi	72,0	76,9	72,4	57,1	70,0	68,2	50,0	60,0	65,0	46,7	47,1
di cui solo cannabinoidi	68,0	56,4	69,0	42,9	65,0	59,1	45,5	60,0	65,0	40,0	41,2
altre sostanze illegali	24,0	15,4	27,6	25,7	25,0	50,0	27,3	40,0	20,0	40,0	47,1
abuso concomitante di psicofarmaci**	4,0	5,1	3,4	2,9	10,0	4,5	18,2	0,0	5,0	20,0	0,0
di cui benzodiazepine	0,0	2,6	0,0	2,9	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	6,7	0,0
anche alcol	12,0	12,8	20,7	11,4	25,0	22,7	18,2	25,0	30,0	13,3	5,9
uso di una qualsiasi sostanza via vena	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	4,5	0,0	5,0	5,0	6,7	0,0

Ospedale	8,0	20,5	17,2	5,7	10,0	22,7	22,7	0,0	5,0	13,3	17,6
Psichiatria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pronto soccorso	68,0	61,5	75,9	37,1	50,0	50,0	50,0	75,0	55,0	46,7	70,6
SERT	28,0	30,8	17,2	60,0	50,0	31,8	22,7	25,0	45,0	46,7	23,5
di cui anche Carcere Minorile	0,0	5,1	3,4	14,3	-	-	4,5	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 7 - Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
oppiodi	2110	2094	2138	2281	2418	2600	2495	2877	3019	2872	2923
nuovi contatti	10.1	9.7	10.3	11.9	11.8	16.9	11.6	14.0	15.4	17.6	16.8
età media	43.6	42.9	42.2	41.3	41.0	41.0	39.7	39.5	39.3	37.3	36.8
maschi	78.8	78.8	78.3	79.0	79.9	78.7	80.1	79.3	79.4	80.1	79.8
femmine	21.2	21.2	21.7	21.0	20.1	21.3	19.9	20.7	20.6	19.9	20.2
nativi	81.2	81.1	81.5	80.0	79.1	79.3	80.0	81.3	81.5	81.1	82.5
non nativi	18.6	18.7	18.2	19.8	20.8	20.4	19.8	18.7	18.5	18.9	17.5
residenti area metropolitana	81.5	78.6	81.0	73.5	74.7	74.3	71.6	71.7	72.1	68.9	69.6
residenti fuori area metropolitana	15.7	18.9	15.5	24.2	23.4	23.5	26.2	27.0	27.8	28.7	30.2
senza fissa dimora (SFD)	6.5	7.1	7.0	6.4	6.7	7.0	6.3	4.6	4.1	7.2	6.7
decesso overdose	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2
di cui solo oppiodi	70.0	70.2	72.4	78.2	78.7	80.9	83.3	75.2	78.4	83.3	69.6
di cui eroina	93.3	94.8	94.4	94.3	95.0	90.8	94.7	90.3	87.0	95.1	92.9
cocaina	30.0	29.8	27.6	21.8	21.3	19.1	16.7	24.7	21.6	16.7	30.4
cannabinoidi	6.9	7.5	7.6	9.2	6.9	7.3	8.0	10.5	8.9	7.0	11.3
altre sostanze illegali	3.8	5.3	4.5	3.6	3.8	7.3	3.7	7.0	5.0	1.7	5.1
abuso concomitante di psicofarmaci*	2.7	2.7	2.4	4.6	3.3	3.4	2.4	3.8	5.0	3.6	6.6
di cui benzodiazepine	1.6	1.5	1.4	2.3	1.7	1.6	1.7	3.5	2.6	1.6	3.1
anche alcol	8.5	9.2	8.3	8.2	9.0	9.5	8.2	18.6	18.2	22.3	23.5
uso di una qualsiasi sostanza via vena	42.8	43.7	44.7	45.0	44.9	43.4	46.6	43.4	44.7	50.1	46.6
Ospedale	4.2	5.8	5.4	4.8	4.0	5.2	4.7	4.9	3.8	3.5	3.6
Psichiatria	4.1	4.0	3.6	3.6	4.4	3.7	2.3	2.1	1.7	1.5	1.4
Pronto soccorso	13.2	8.2	6.6	6.0	5.7	12.8	11.3	11.6	10.5	6.9	7.7
SERT	93.7	95.1	95.5	94.5	94.7	90.3	94.3	88.4	87.2	93.5	89.9
di cui anche Carcere	10.8	12.2	12.5	15.1	17.0	17.1	17.6	18.4	17.4	17.2	13.6
di cui anche Unità Mobile Metadone	6.1	6.6	6.5	6.4	7.1	7.0	5.3	4.8	4.9	6.7	5.9

\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 8 - Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	214	203	221	272	285	439	289	402	465	506	492
età media	38.9	37.2	36.7	34.7	37.3	41.7	35.0	35.1	36.6	33.0	32.4
maschi	75.7	78.8	75.6	78.3	80.0	70.6	81.7	81.3	78.5	83.4	80.5
femmine	24.3	21.2	24.4	21.7	20.0	29.4	18.3	18.7	21.5	16.6	19.5
nativi	66.4	60.1	62.4	55.1	62.1	68.3	59.5	62.9	66.2	61.9	70.3
non nativi	33.6	38.9	37.1	44.9	37.9	30.8	39.8	37.1	33.8	38.1	29.7
residenti area metropolitana	53.3	40.9	55.7	41.2	47.0	52.6	37.7	38.1	47.3	35.8	39.2
residenti fuori area metropolitana	39.7	52.7	38.9	50.7	48.8	42.4	54.0	59.2	52.5	58.1	60.4
senza fissa dimora (SFD)	7.0	12.3	9.5	11.8	10.2	10.9	9.7	8.0	3.7	13.4	8.3
decesso overdose	3.3	1.0	1.8	1.8	2.8	2.1	2.1	2.0	0.9	0.2	0.0

di cui solo oppioidi	66.4	58.1	60.6	72.1	73.0	81.8	78.5	80.8	83.9	86.2	70.1
di cui eroina	64.0	79.8	82.4	76.5	80.0	64.0	76.8	84.6	73.5	87.7	85.6
cocaina	33.6	41.9	39.4	27.9	27.0	18.2	21.5	19.2	16.1	13.8	29.9
cannabinoidi	6.5	8.9	10.4	11.4	6.0	9.6	16.6	9.5	6.2	6.3	12.2
altre sostanze illegali	6.5	5.4	2.3	1.8	2.1	10.5	2.8	4.5	7.3	1.2	5.1
abuso concomitante di psicofarmaci**	6.1	4.4	6.3	7.0	7.4	3.6	4.2	5.5	6.7	5.3	9.8
di cui benzodiazepine	1.9	1.5	1.8	2.9	2.5	0.2	2.8	2.7	1.7	0.8	2.0
anche alcol	6.1	5.4	6.3	5.1	8.4	8.9	4.5	11.7	14.4	11.1	11.4
uso di una qualsiasi sostanza via vena	17.3	22.2	24.9	15.4	18.2	18.7	20.1	29.6	24.3	28.9	20.3

Ospedale	22.4	15.8	14.0	11.8	15.1	14.6	11.8	5.5	8.0	5.3	4.9
Psichiatria	4.7	2.0	0.0	0.7	1.4	3.6	1.7	1.0	0.2	1.6	0.8
Pronto soccorso	22.0	18.7	15.8	15.1	11.9	30.5	18.7	20.9	20.2	12.3	16.3
SERT	58.4	72.4	79.2	74.3	73.3	56.0	72.7	75.6	71.6	81.4	68.5
di cui anche Carcere	13.1	25.6	25.8	32.0	21.8	17.5	28.4	38.6	28.8	30.4	27.6
di cui anche Unità Mobile Metadone	9.8	14.3	13.6	11.8	15.4	15.0	12.1	9.5	6.9	14.6	6.7

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 9 - Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totali	1487	1370	1289	1121	1091	1033	933	1115	1023	955	1282
nuovi contatti	24.2	25.0	26.0	25.5	24.1	25.4	25.7	21.3	23.1	23.8	21.8
età media	39.0	38.8	38.6	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	38.0	37.3	35.7
maschi	82.6	84.2	83.6	84.6	84.8	85.7	87.0	85.6	85.4	86.0	86.0
femmine	17.4	15.8	16.4	15.4	15.2	14.3	13.0	14.4	14.6	14.0	14.0
nativi	72.4	71.9	72.2	71.5	70.9	71.0	73.0	76.4	79.0	77.8	75.1
non nativi	27.4	28.0	27.6	28.5	28.9	28.8	26.7	23.6	21.0	22.2	24.9
residenti area metropolitana	73.4	70.7	71.1	67.3	68.3	67.2	67.8	67.7	69.8	67.0	60.5
residenti fuori area metropolitana	23.9	26.9	25.8	30.2	30.0	30.3	29.9	30.9	30.0	32.1	39.4
senza fissa dimora (SFD)	5.6	5.7	5.5	5.6	5.0	6.7	4.9	5.5	4.6	6.0	8.4
decesso overdose	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4

di cui solo cocaina	57.4	54.5	54.2	55.6	52.7	51.9	55.4	36.1	36.4	49.8	30.6
oppiodi	42.6	45.5	45.8	44.4	47.3	48.1	44.6	63.9	63.6	50.2	69.4
cannabinoidi	13.0	13.9	14.0	15.1	12.4	11.0	10.1	13.0	8.8	6.7	13.0
altre sostanze illegali	5.2	6.3	8.5	5.5	6.1	9.5	5.4	9.2	7.5	2.3	6.5
abuso concomitante di psicofarmaci*	3.7	3.1	3.6	3.9	3.2	3.2	3.0	7.8	6.5	5.4	8.9
di cui benzodiazepine	2.0	1.8	1.9	2.0	1.4	1.5	1.3	3.7	2.7	1.8	3.5
anche alcol	18.6	15.7	16.0	17.3	17.3	16.8	15.4	21.7	19.8	30.9	31.0
uso di una qualsiasi sostanza via vena	21.0	22.7	23.9	24.7	25.2	26.6	27.0	30.8	32.8	29.3	30.0

Ospedale	6.7	8.2	9.6	7.9	6.5	6.1	6.4	5.7	6.3	4.8	3.9
Psichiatria		4.2	5.3	6.4	8.2	6.9	3.8	2.4	2.7	1.9	1.6
Pronto soccorso	17.6	14.2	14.7	13.5	12.5	14.7	18.8	17.4	14.7	10.6	7.7
SERT	83.1	84.2	83.9	83.4	84.6	83.7	84.2	85.1	85.6	84.2	85.1
di cui anche Carcere	22.5	25.0	27.5	27.2	31.6	31.3	28.4	27.6	27.9	28.3	26.4
di cui anche Unità Mobile Metadone	4.2	5.3	5.2	5.0	1.9	6.7	4.4	5.4	5.0	3.5	6.9

\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 10 - Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	360	342	335	286	263	262	240	237	236	227	279
età media	34.6	34.2	34.7	34.0	34.7	33.6	34.2	34.3	35.5	35.6	32.2
maschi	83.9	87.4	86.6	86.4	87.1	86.6	90.8	91.1	86.0	88.5	88.2
femmine	16.1	12.6	13.4	13.6	12.9	13.4	9.2	8.9	14.0	11.5	11.8
nativi	64.7	60.5	62.1	52.8	63.5	64.1	65.8	63.3	70.8	74.0	67.4
non nativi	35.0	39.5	37.9	47.2	36.1	35.5	33.8	36.7	29.2	26.0	32.6
residenti area metropolitana	60.8	53.2	53.7	43.7	52.1	50.8	55.4	49.8	59.7	55.1	37.6
residenti fuori area metropolitana	36.1	43.6	42.4	50.7	46.0	45.0	41.3	48.1	40.3	43.2	62.4
senza fissa dimora (SFD)	3.1	6.4	5.4	7.0	4.2	9.5	6.3	5.9	1.7	5.7	7.9
decesso overdose	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0

di cui solo cocaina	80.0	75.1	74.0	73.4	70.7	69.5	74.2	67.5	68.2	69.2	47.3
oppiodi	20.0	24.9	26.0	22.7	29.3	30.5	25.8	32.5	31.8	30.8	52.7
cannabinoidi	17.2	19.3	23.6	26.2	19.0	19.1	18.8	19.0	8.5	4.4	13.6
altre sostanze illegali	5.0	4.4	7.5	3.8	5.7	13.0	3.8	5.5	11.9	1.3	3.2
abuso concomitante di psicofarmaci**	4.4	3.2	3.0	2.4	3.0	3.1	3.8	5.1	8.5	7.0	8.6
di cui benzodiazepine	3.1	2.3	1.8	1.0	0.8	1.1	0.8	3.0	2.5	0.9	1.1
anche alcol	21.1	17.3	14.6	13.6	14.8	16.0	17.9	17.7	19.9	26.0	20.8
uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.9	9.6	10.4	8.0	8.4	11.5	12.1	12.2	8.9	12.3	10.4

Ospedale	10.6	8.2	12.5	8.0	8.7	9.2	5.0	3.4	11.0	7.9	4.3
Psichiatria	2.8	2.6	0.0	2.8	4.6	8.0	5.4	2.5	2.1	1.8	1.1
Pronto soccorso	26.7	24.0	26.6	21.0	17.9	23.7	31.3	28.3	29.2	21.1	10.4
SERT	65.6	69.3	69.3	73.4	74.9	68.7	65.4	64.1	62.3	66.5	70.3
di cui anche Carcere	23.6	28.4	33.4	39.5	35.4	26.0	30.8	35.9	30.9	28.2	39.8
di cui anche Unità Mobile Metadone	2.8	7.0	5.4	5.6	6.1	10.7	6.3	5.9	3.8	3.5	4.3

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 11 - Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	613	592	570	583	512	533	530	572	472	401	560
nuovi contatti	34.7	38.9	40.9	35.8	33.8	41.7	47.4	35.3	31.4	29.9	26.3
età media	33.7	33.3	33.4	34.3	33.4	33.0	32.2	34.4	33.5	33.2	32.8
maschi	86.1	85.5	85.6	85.8	84.8	87.2	88.7	85.5	86.0	87.8	86.1
femmine	13.9	14.5	14.4	14.2	15.2	12.8	11.3	14.5	14.0	12.2	13.9
nativi	68.7	67.9	70.7	70.8	71.3	66.8	69.8	76.2	80.3	80.5	77.5
non nativi	31.0	32.1	29.3	29.2	28.5	32.8	30.0	23.8	19.7	19.5	22.5
residenti area metropolitana	76.2	73.0	73.0	69.3	73.6	69.4	67.5	76.2	77.3	72.1	68.2
residenti fuori area metropolitana	23.0	26.0	25.6	28.5	25.6	29.3	31.3	23.4	22.7	27.4	31.8
senza fissa dimora (SFD)	2.0	3.2	3.3	3.1	2.9	3.8	2.8	3.8	3.6	5.5	6.3
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.2

di cui solo cannabinoidi	46.2	44.4	42.1	37.4	44.1	44.1	46.4	34.4	33.1	38.7	24.3
cocaina	31.6	32.3	31.8	29.0	26.4	21.4	17.7	25.3	19.1	16.0	29.8
oppiodi	23.8	26.5	28.4	35.8	32.8	35.6	37.7	52.6	57.0	49.9	59.1
altre sostanze illegali	7.8	8.3	9.1	6.5	8.8	10.9	6.6	8.7	7.0	5.2	8.4
abuso concomitante di psicofarmaci*	3.6	2.5	1.9	1.9	2.9	3.2	3.2	6.5	5.1	4.5	3.9
di cui benzodiazepine	2.0	1.7	0.5	0.5	0.8	0.8	1.3	3.3	3.2	2.0	2.0
anche alcol	15.8	16.9	15.6	16.6	15.6	17.1	14.2	22.0	16.7	24.4	24.6
uso di una qualsiasi sostanza via vena	9.6	10.1	10.9	14.1	10.2	9.6	11.1	17.8	23.5	19.7	20.5

Ospedale	12.1	14.2	10.7	10.6	11.3	9.8	10.8	8.0	6.4	6.7	5.5
Psichiatria	9.1	6.4	7.9	8.7	10.4	7.9	5.7	3.8	4.4	3.7	2.9
Pronto soccorso	23.7	23.8	22.1	15.3	13.5	19.5	26.2	18.4	16.9	11.2	7.1
SERT	67.4	66.9	70.9	76.7	75.2	71.9	69.8	76.6	81.4	80.0	85.0
di cui anche Carcere	19.2	21.1	23.2	23.2	24.8	26.6	21.9	17.0	14.6	17.0	20.7
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.7	1.4	0.9	1.4	0.8	1.9	0.9	2.4	2.3	1.2	3.0

\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 12 - Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	213	230	233	209	173	222	251	202	148	120	147
età media	28.6	27.6	29.2	29.6	29.6	29.6	28.4	30.4	29.3	29.7	28.3
maschi	87.3	83.5	87.6	87.1	83.8	86.0	87.6	87.1	83.1	86.7	87.8
femmine	12.7	16.5	12.4	12.9	16.2	14.0	12.4	12.9	16.9	13.3	12.2
nativi	62.9	63.0	63.9	54.1	66.5	60.8	68.1	65.3	71.6	80.0	68.7
non nativi	36.6	37.0	36.1	45.9	33.5	38.3	31.9	34.7	28.4	20.0	31.3
residenti area metropolitana	65.7	66.1	60.9	51.2	63.6	60.8	60.6	67.8	66.2	67.5	49.0
residenti fuori area metropolitana	33.3	32.2	37.3	44.0	35.8	38.3	38.2	31.2	33.8	31.7	51.0
senza fissa dimora (SFD)	0.9	0.9	1.7	4.8	2.3	2.7	2.8	2.5	0.7	2.5	2.7
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0
di cui solo cannabinoidi	66.2	64.3	57.5	50.7	62.4	59.9	64.1	62.9	68.2	66.7	37.4
cocaina	29.1	28.7	33.9	35.9	28.9	22.5	17.9	22.3	13.5	8.3	25.9
oppiodi	6.6	7.8	9.9	14.8	9.8	18.9	19.1	18.8	19.6	26.7	40.8
altre sostanze illegali	6.6	6.5	4.3	5.3	6.4	11.7	5.6	5.0	3.4	4.2	5.4
abuso concomitante di psicofarmaci**	3.3	3.9	3.0	0.0	4.0	3.6	2.8	4.5	6.1	5.0	2.0
di cui benzodiazepine	2.8	3.5	1.3	0.0	0.6	0.9	0.8	1.0	3.4	2.5	0.7
anche alcol	16.0	17.8	15.0	13.4	16.2	15.3	15.1	24.8	21.6	15.0	10.9
uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.4	1.7	5.2	5.3	0.0	4.5	2.0	4.0	4.1	9.2	9.5
Ospedale	15.0	15.7	11.6	10.0	15.6	14.4	11.2	8.9	10.8	13.3	9.5
Psichiatria	5.2	2.6	0.0	5.3	4.0	9.0	6.0	2.0	2.0	1.7	2.0
Pronto soccorso	37.6	42.6	38.6	24.4	24.9	27.5	37.8	30.7	31.1	25.8	13.6
SERT	46.5	47.0	55.4	65.1	61.3	55.4	54.2	52.0	56.1	63.3	72.8
di cui anche Carcere	20.2	15.2	25.3	30.1	26.0	23.9	20.7	22.3	18.2	10.8	36.7
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.5	0.9	1.3	1.9	1.2	1.4	1.6	1.5	2.0	0.0	2.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 13 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	2778	2667	2673	2770	2853	2864	2871	2933	3032	3189	3026
mai stato in precedenza al SERT	15.7	14.8	15.3	15.5	15.6	14.7	13.2	14.3	15.1	16.7	17.8
età media	41.5	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4
maschi	81.9	81.7	81.7	81.6	82.1	82.4	82.3	81.5	81.8	81.8	81.3
femmine	18.1	18.3	18.3	18.4	17.9	17.6	17.7	18.5	18.2	18.2	18.7
nativi	78.5	78.6	78.6	78.1	77.6	76.9	78.2	78.8	79.6	80.5	82.2
non nativi	21.3	21.3	21.3	21.8	22.4	23.0	21.6	21.2	20.4	19.5	17.8
residenti area metropolitana	80.5	78.1	79.0	73.1	74.6	73.5	71.7	70.4	70.1	69.6	71.3
residenti fuori area metropolitana	17.0	19.5	17.5	24.6	23.8	24.6	26.4	28.3	29.7	28.5	28.5
senza fissa dimora (SFD)	5.9	6.4	6.5	6.2	5.9	6.6	5.7	4.3	4.0	5.9	5.7
decesso overdose	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
eroina	69.3	72.6	73.8	75.8	78.8	79.7	80.4	82.5	82.6	82.5	72.9
cocaina	42.3	41.2	38.7	31.9	30.8	28.9	25.8	23.2	21.5	23.1	19.2
cannabinoidi	14.2	14.1	14.4	15.3	13.0	13.0	12.3	10.5	9.9	9.6	7.6
crack	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4
amfetamine	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
ecstasy	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2
benzodiazepine	1.6	1.4	1.4	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2	1.1
tramadol	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
codeina	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
ossicodone	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anche gioco	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
anche alcol	7.9	6.4	6.8	6.1	7.0	6.3	6.3	5.8	6.1	5.4	5.3
uso di una qualsiasi sostanza via vena	33.2	35.2	36.5	37.6	38.7	40.0	41.1	42.7	44.8	46.1	45.0

Ospedale	2.5	4.6	4.0	3.4	2.4	2.6	2.8	3.4	2.8	2.6	2.7
Psichiatria	3.4	3.4	3.5	3.6	4.5	3.7	2.3	2.2	1.7	0.0	1.3
Pronto soccorso	9.7	5.6	4.9	4.2	4.0	7.1	8.4	8.4	6.7	4.5	4.6
anche Carcere	16.0	16.6	17.9	18.7	20.9	22.0	21.5	23.5	22.5	20.2	15.9
anche Unità Mobile Metadone	5.0	5.7	5.3	5.4	6.0	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1	5.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

**Tab. 14 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	435	396	408	429	444	422	380	420	459	532	539
età media	34.3	33.3	33.9	32.8	33.1	32.8	32.6	32.4	32.1	31.6	31.9
maschi	84.8	86.9	85.8	86.0	86.5	84.1	87.9	85.0	85.2	86.5	85.2
femmine	15.2	13.1	14.2	14.0	13.5	15.9	12.1	15.0	14.8	13.5	14.8
nativi	66.0	64.4	63.5	56.2	67.8	62.8	66.3	59.3	65.4	63.5	69.6
non nativi	33.8	35.6	36.5	43.8	32.2	37.0	33.2	40.7	34.6	36.5	30.4
residenti area metropolitana	65.1	58.1	58.6	50.3	57.4	53.3	53.7	43.3	43.8	41.7	46.2
residenti fuori area metropolitana	31.0	36.6	37.0	43.1	39.9	42.9	42.9	53.8	55.8	54.5	53.6
senza fissa dimora (SFD)	5.7	10.6	7.6	9.6	8.1	12.3	7.9	6.9	2.6	8.3	4.1
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
eroina	32.2	40.9	42.6	46.2	55.0	56.4	52.4	61.7	60.8	68.4	55.5
cocaina	60.5	60.1	56.9	52.7	49.5	44.8	40.8	30.7	27.2	24.6	24.5
cannabinoidi	26.4	28.0	30.9	32.9	24.1	28.2	32.6	21.4	15.3	12.4	13.0
crack	3.2	2.5	2.0	0.7	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4
amfetamine	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
ecstasy	0.5	0.5	0.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0
benzodiazepine	1.6	2.3	1.2	1.4	2.3	0.0	1.8	1.2	1.1	0.8	1.3
tramadol	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0
codeina	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ossicodone	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anche gioco	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
anche alcol	9.9	4.0	4.9	6.1	6.8	7.1	8.2	5.5	5.2	3.4	4.1
uso di una qualsiasi sostanza via vena	11.3	13.1	15.2	11.9	17.1	21.6	16.1	25.0	20.3	24.6	23.7
Ospedale	3.7	5.3	5.1	3.0	3.8	2.1	2.6	1.4	2.2	1.7	3.0
Psiichiatria	1.8	1.5	1.0	2.6	4.3	5.2	2.6	1.2	1.5	1.1	0.9
Pronto soccorso	8.3	6.8	6.4	4.7	5.0	7.8	7.9	6.2	5.0	3.9	5.4
anche Carcere	26.0	28.0	32.1	38.5	30.9	30.6	32.9	46.0	43.1	37.6	40.3
anche Unità Mobile Metadone	5.7	10.4	8.8	7.9	11.3	14.9	8.4	8.6	5.9	12.0	3.2

\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 15 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	665	523	482	488	393	609	660	632	487	406	469
nuovi contatti	41.5	50.1	52.9	53.1	47.6	53.7	52.1	50.9	49.5	57.4	59.1
età media	38.6	37.6	37.7	37.9	37.3	41.5	36.2	37.0	37.8	36.5	39.2
maschi	75.2	77.6	79.0	74.4	76.8	68.0	78.6	77.7	75.8	76.4	73.1
femmine	24.8	22.4	21.0	25.6	23.2	32.0	21.4	22.3	24.2	23.6	26.9
nativi	73.1	70.9	72.6	70.5	73.5	78.5	78.8	80.7	82.8	73.6	81.9
non nativi	26.6	28.3	27.0	28.9	26.2	20.9	20.9	19.3	17.2	26.4	18.1
residenti area metropolitana	73.7	69.0	67.8	69.1	71.8	75.2	71.7	67.4	73.5	68.0	72.5
residenti fuori area metropolitana	23.2	29.8	29.7	27.0	27.7	23.8	26.5	32.4	26.3	30.0	27.3
senza fissa dimora (SFD)	5.4	3.8	4.8	2.9	2.8	3.8	5.3	3.8	3.9	6.9	4.7
decesso overdose	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.2	0.2
oppiodi	42.0	32.7	29.3	28.3	34.9	54.7	42.9	53.0	64.9	48.8	48.2
di cui eroina	35.3	27.0	23.4	20.9	27.5	37.3	35.5	45.7	43.9	35.2	32.6
cocaina	39.4	37.3	39.4	30.9	34.6	25.0	26.5	30.7	30.8	24.9	21.1
di cui solo cocaina	24.1	23.1	25.9	20.5	22.1	12.2	15.8	12.5	11.7	11.3	6.0
cannabinoidi	21.8	27.0	26.1	18.2	17.6	17.1	21.1	16.6	16.4	11.1	8.5
di cui solo cannabinoidi	12.2	19.5	17.8	10.5	13.7	11.7	13.2	10.6	7.8	6.7	5.1
altre sostanze illegali	27.4	38.2	41.1	57.0	37.7	46.5	41.1	40.5	34.1	36.2	58.4
abuso concomitante di psicofarmaci**	16.7	17.4	14.5	14.8	19.6	21.8	10.5	16.1	20.1	17.5	25.2
di cui benzodiazepine	10.7	10.7	8.3	5.9	8.4	10.7	4.1	8.9	8.4	7.6	11.7
anche alcol	32.9	38.2	39.8	37.7	39.7	33.7	32.0	40.5	27.3	43.3	46.1
uso di una qualsiasi sostanza via vena	19.5	12.4	12.2	10.5	16.0	20.7	21.1	25.2	26.1	22.4	19.8
Ospedale	9.6	13.6	14.9	9.0	10.9	11.7	10.0	10.8	9.2	13.8	13.6
Psichiatria	4.8	3.6	3.1	4.1	6.6	3.8	3.5	2.7	2.9	2.0	2.3
SERT	40.6	28.7	27.4	23.8	29.3	33.3	36.7	38.8	41.9	35.2	29.9
di cui anche Carcere	3.5	2.3	4.4	4.3	3.6	4.6	3.8	4.4	4.5	6.9	2.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	5.4	3.3	3.9	2.0	2.3	3.4	3.6	3.5	3.5	3.7	3.4

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 16 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale*</b>	276	262	255	259	187	327	344	322	241	233	277
età media	33.7	32.1	33.8	35.5	33.6	42.0	31.9	34.1	35.1	33.8	38.8
maschi	78.3	75.6	78.4	72.2	77.0	62.7	78.8	78.3	72.6	72.5	71.8
femmine	21.7	24.4	21.6	27.8	23.0	37.3	21.2	21.7	27.4	27.5	28.2
nativi	66.3	62.2	68.2	64.5	65.8	74.3	71.5	73.0	75.1	67.8	76.5
non nativi	33.0	36.3	31.0	34.4	33.7	25.1	28.5	27.0	24.9	32.2	23.5
residenti area metropolitana	58.0	54.2	57.3	54.4	57.2	64.8	62.5	52.5	62.7	60.1	63.5
residenti fuori area metropolitana	38.0	43.9	38.8	40.2	42.2	34.6	35.5	47.2	37.3	37.8	36.1
senza fissa dimora (SFD)	1.4	1.1	2.4	1.2	1.1	1.8	1.2	1.2	1.2	2.6	1.8
decesso overdose	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
oppiodi	17.0	14.5	13.7	15.8	18.2	41.0	15.7	26.1	39.0	26.6	28.9
di cui eroina	8.3	9.9	8.2	6.6	11.8	16.8	7.8	17.4	10.8	11.6	10.8
cocaina	34.8	31.3	34.9	23.2	25.1	19.0	21.8	20.8	28.6	20.6	10.5
di cui solo cocaina	29.0	24.0	29.0	18.5	20.3	14.1	18.9	16.1	17.8	14.6	6.5
cannabinoidi	29.0	37.4	35.3	19.7	23.0	18.7	27.6	19.3	19.1	13.3	7.2
di cui solo cannabinoidi	21.0	32.4	26.7	15.1	21.4	15.6	22.4	17.1	14.5	10.3	6.1
altre sostanze illegali	31.9	33.6	34.1	52.9	39.6	43.1	49.1	45.0	40.2	49.8	64.3
abuso concomitante di psicofarmaci**	13.8	13.4	12.2	10.8	15.5	22.3	7.3	8.1	16.6	15.0	18.4
di cui benzodiazepine	10.5	8.8	8.6	3.1	7.0	11.0	1.7	4.0	5.8	6.0	7.2
anche alcol	29.3	31.7	31.8	28.6	30.5	25.7	25.6	33.9	21.2	28.8	34.3
uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.8	1.1	2.4	0.8	2.1	3.4	1.5	3.7	4.6	3.9	2.5
Ospedale	5.8	8.8	9.0	3.1	4.8	7.6	5.8	6.2	5.4	13.3	7.2
Psichiatria	0.4	1.5	0.0	1.5	0.5	1.2	3.2	0.0	0.4	1.3	0.7
SERT	8.3	8.8	8.2	3.5	7.5	6.7	6.7	7.5	10.0	10.3	5.8
di cui anche Carcere	0.7	0.8	2.0	1.9	1.6	0.9	2.0	1.9	0.8	2.1	1.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	2.5	1.1	2.7	0.8	1.1	1.8	0.9	1.6	2.1	2.1	1.4

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 17 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	314	318	279	285	287	310	242	245	261	326	214
nuovi contatti	62.1	46.9	45.5	47.7	55.4	58.1	46.7	39.6	57.5	57.7	47.2
età media	43.4	43.2	42.5	45.6	45.7	45.0	44.4	45.5	48.4	47.3	42.0
maschi	60.8	64.8	66.7	68.8	65.9	66.8	66.9	66.9	62.5	52.1	55.6
femmine	39.2	35.2	33.3	31.2	34.1	33.2	33.1	50.6	60.2	47.9	44.4
nativi	75.2	78.9	84.2	86.0	82.6	84.8	83.1	99.6	105.4	86.8	87.9
non nativi	24.5	20.8	15.1	14.0	17.4	15.2	16.9	18.0	17.2	13.2	12.1
residenti area metropolitana	88.2	86.2	86.7	87.0	86.8	90.3	87.2	102.4	104.2	83.4	83.2
residenti fuori area metropolitana	11.1	13.5	12.2	12.6	12.9	9.4	12.0	15.1	18.4	16.6	16.4
senza fissa dimora (SFD)	2.2	2.8	4.7	1.1	2.8	2.6	2.5	4.1	1.1	2.1	3.7
decesso overdose	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5
oppiodi	28.3	38.1	41.6	38.6	33.4	43.9	48.8	57.6	44.4	30.4	46.7
di cui eroina	12.7	26.4	26.9	23.5	16.0	21.0	28.5	40.8	30.7	22.1	32.2
cocaina	31.8	35.5	44.4	30.9	24.7	20.3	24.8	25.7	24.5	14.1	21.0
di cui solo cocaina	21.3	19.8	25.1	18.6	15.3	10.6	10.3	8.2	9.2	6.7	7.9
cannabinoidi	23.6	26.4	21.9	21.8	20.2	16.8	23.6	18.8	11.5	8.3	12.1
di cui solo cannabinoidi	13.7	14.2	11.8	9.8	11.8	12.3	14.5	9.0	6.1	4.6	7.9
altre sostanze illegali	46.5	46.2	49.5	47.4	49.1	45.8	30.6	51.8	59.8	58.3	60.3
abuso concomitante di psicofarmaci**	22.9	19.8	14.7	25.3	25.8	24.5	28.1	40.4	37.9	50.6	28.5
di cui benzodiazepine	15.9	13.2	4.3	15.8	15.3	16.1	20.7	27.3	29.1	15.3	7.9
anche alcol	23.9	27.0	33.7	24.9	28.9	30.0	24.4	32.7	24.5	18.4	26.6
uso di una qualsiasi sostanza via vena	8.0	15.4	17.6	18.6	10.5	13.5	19.8	20.4	20.7	15.3	22.0
Psichiatria	8.3	6.9	8.2	11.6	14.3	9.0	7.4	7.8	5.0	2.5	5.6
Pronto soccorso	20.4	22.3	25.8	15.4	15.0	22.9	27.3	27.8	19.9	17.2	29.4
SERT	22.3	39.0	38.4	32.6	24.0	23.9	32.6	41.2	32.6	25.5	38.3
di cui anche Carcere	1.3	2.5	3.6	3.5	1.4	2.3	0.8	4.9	3.1	4.9	0.5
di cui anche Unità Mobile Metadone	1.9	1.9	2.9	1.1	1.4	1.3	1.2	4.1	1.9	0.6	0.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 18 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali.  
Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale*</b>	195	149	127	136	159	180	113	97	150	188	101
età media	46.5	44.7	42.9	50.0	48.7	46.8	48.0	44.8	45.8	51.5	44.0
maschi	55.9	59.1	61.4	65.4	62.3	61.7	54.0	53.6	50.0	41.0	50.5
femmine	44.1	40.9	38.6	34.6	37.7	38.3	46.0	42.3	50.0	59.0	49.5
nativi	75.4	76.5	81.9	85.3	81.1	82.8	84.1	78.4	80.0	86.7	85.1
non nativi	24.1	22.8	16.5	14.7	18.9	17.2	15.9	17.5	20.0	13.3	14.9
residenti area metropolitana	84.6	79.2	78.7	77.9	80.5	85.6	82.3	81.4	75.3	79.8	73.3
residenti fuori area metropolitana	14.4	20.1	19.7	21.3	18.9	13.9	16.8	14.4	24.7	20.2	26.7
senza fissa dimora (SFD)	0.0	1.3	1.6	0.0	1.9	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
oppiodi	24.6	21.5	24.4	23.5	27.0	35.6	30.1	22.7	24.7	11.2	23.8
di cui eroina	2.6	5.4	5.5	0.0	3.8	4.4	3.5	5.2	6.0	1.6	7.9
cocaina	19.5	18.8	33.1	16.9	14.5	13.3	10.6	8.2	17.3	5.3	11.9
di cui solo cocaina	14.9	16.1	26.0	14.7	10.1	7.8	5.3	7.2	11.3	4.8	8.9
cannabinoidi	16.4	24.2	21.3	15.4	17.0	17.8	24.8	18.6	10.7	4.8	13.9
di cui solo cannabinoidi	11.3	17.4	17.3	11.0	12.6	14.4	20.4	16.5	7.3	2.1	11.9
altre sostanze illegali	40.0	38.3	46.5	41.2	39.6	40.0	22.1	55.7	64.7	81.9	63.4
abuso concomitante di psicofarmaci**	25.1	24.2	15.0	26.5	25.8	24.4	37.2	20.6	10.7	63.8	17.8
di cui benzodiazepine	19.0	18.8	3.9	20.6	17.0	17.8	30.1	10.3	2.7	18.6	5.0
anche alcol	12.8	12.1	20.5	13.2	17.6	17.2	9.7	21.6	13.3	5.9	18.8
uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.5	1.3	3.1	0.0	1.3	0.6	0.9	1.0	2.7	0.5	3.0
Psichiatria	2.1	5.4	0.0	3.7	3.1	4.4	6.2	2.1	0.7	4.3	11.9
Pronto soccorso	8.2	15.4	18.1	5.9	5.7	13.9	17.7	20.6	8.7	12.8	19.8
SERT	5.6	10.1	12.6	3.7	5.7	2.2	5.3	4.1	6.7	2.1	7.9
di cui anche Carcere	0.5	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.5	0.7	2.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 19 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	220	186	191	189	273	258	129	111	89	80	76
nuovi contatti	16.8	15.1	0.0	13.2	11.0	34.1	24.0	20.7	13.5	21.3	21.1
età media	39.1	41.3	40.4	37.9	37.9	39.4	38.7	38.9	39.4	38.3	37.7
maschi	73.6	71.0	69.6	70.4	70.7	73.3	75.2	72.1	71.9	73.8	75.0
femmine	26.4	29.0	30.4	29.6	29.3	26.7	24.8	27.9	28.1	26.3	25.0
nativi	91.4	88.7	89.0	88.9	90.5	91.5	94.6	91.0	93.3	93.8	94.7
non nativi	7.7	10.2	8.9	9.5	8.8	7.0	4.7	8.1	6.7	6.3	5.3
residenti area metropolitana	87.7	90.3	91.6	91.5	92.7	89.5	86.8	84.7	93.3	91.3	93.4
residenti fuori area metropolitana	11.4	8.6	6.3	6.3	6.2	8.5	12.4	13.5	6.7	8.8	5.3
senza fissa dimora (SFD)	1.8	2.7	1.0	0.5	2.6	1.6	2.3	1.8	1.1	1.3	1.3
decesso overdose	0.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
oppiodi	39.5	45.2	39.8	42.9	38.8	37.2	45.0	54.1	56.2	55.0	52.6
di cui eroina	30.9	38.7	34.0	37.0	34.8	29.8	41.1	45.0	49.4	45.0	44.7
cocaina	32.3	31.2	35.6	38.1	32.6	27.5	27.1	24.3	31.5	22.5	26.3
di cui solo cocaina	21.4	21.0	21.5	23.3	21.2	20.2	16.3	10.8	13.5	10.0	7.9
cannabinoidi	25.5	20.4	23.6	27.0	19.4	16.3	23.3	19.8	23.6	18.8	21.1
di cui solo cannabinoidi	15.5	10.2	13.1	13.2	12.8	11.6	16.3	11.7	11.2	13.8	11.8
altre sostanze illegali	48.2	50.0	55.5	33.9	54.6	56.2	55.8	60.4	58.4	50.0	63.2
abuso concomitante di psicofarmaci**	4.1	3.2	2.6	6.3	5.9	3.9	7.8	9.9	3.4	5.0	7.9
di cui benzodiazepine	1.4	1.6	2.1	2.1	2.9	2.7	3.1	5.4	3.4	3.8	3.9
anche alcol	17.7	17.7	19.9	18.5	20.5	22.5	17.8	19.8	19.1	32.5	34.2
uso di una qualsiasi sostanza via vena	20.5	24.2	23.0	26.5	24.2	21.3	23.3	27.0	27.0	27.5	31.6
Ospedale	11.8	11.8	12.0	17.5	15.0	10.9	14.0	17.1	14.6	10.0	15.8
Pronto soccorso	14.5	10.2	7.9	10.6	9.5	8.9	17.8	15.3	15.7	10.0	14.5
SERT	43.2	49.5	49.2	52.9	47.3	41.5	51.2	57.7	59.6	56.3	52.6
di cui anche Carcere	0.9	1.1	3.1	3.7	2.9	2.3	1.6	0.9	4.5	3.8	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 20 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria.  
Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale*</b>	37	28	0	25	30	88	31	23	12	17	16
età media	33.1	33.0		32.6	32.9	31.6	30.0	39.7	30.2	37.5	36.3
maschi	64.9	78.6	-	72.0	63.3	73.9	71.0	56.5	58.3	76.5	62.5
femmine	35.1	21.4	-	28.0	36.7	26.1	29.0	43.5	41.7	23.5	37.5
nativi	94.6	85.7	-	60.0	86.7	79.5	93.5	73.9	100.0	88.2	93.8
non nativi	5.4	14.3	-	32.0	13.3	15.9	6.5	21.7	0.0	11.8	6.3
residenti area metropolitana	59.5	64.3	-	84.0	83.3	80.7	77.4	56.5	91.7	88.2	81.3
residenti fuori area metropolitana	40.5	35.7	-	8.0	16.7	14.8	22.6	34.8	8.3	11.8	12.5
senza fissa dimora (SFD)	0.0	3.6	-	0.0	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	2.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
oppiodi	27.0	14.3	-	8.0	13.3	18.2	16.1	17.4	8.3	47.1	25.0
di cui eroina	5.4	7.1	-	8.0	6.7	4.5	9.7	8.7	8.3	17.6	12.5
cocaina	27.0	32.1	-	32.0	40.0	23.9	41.9	26.1	41.7	23.5	18.8
di cui solo cocaina	21.6	28.6	-	28.0	36.7	22.7	32.3	21.7	41.7	11.8	12.5
cannabinoidi	29.7	21.4	-	44.0	23.3	22.7	48.4	17.4	25.0	11.8	18.8
di cui solo cannabinoidi	21.6	14.3	-	28.0	20.0	17.0	29.0	17.4	16.7	5.9	18.8
altre sostanze illegali	37.8	64.3	-	44.0	56.7	53.4	51.6	56.5	50.0	47.1	56.3
abuso concomitante di psicofarmaci**	2.7	3.6	-	4.0	3.3	1.1	12.9	4.3	0.0	0.0	6.3
di cui benzodiazepine	0.0	3.6	-	4.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
anche alcol	5.4	14.3	-	12.0	13.3	12.5	19.4	8.7	16.7	23.5	18.8
uso di una qualsiasi sostanza via vena	2.7	0.0	-	0.0	0.0	3.4	3.2	4.3	0.0	0.0	0.0
Ospedale	10.8	28.6	-	20.0	16.7	9.1	22.6	8.7	8.3	11.8	6.3
Pronto soccorso	2.7	14.3	-	16.0	3.3	4.5	35.5	0.0	8.3	17.6	12.5
SERT	8.1	17.9	-	24.0	23.3	11.4	25.8	17.4	41.7	35.3	18.8
di cui anche Carcere	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 21 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	###
Totale	2902	2799	2723	2671	2827	3354	2901	3087	2837	2976	2927
nuovi contatti	40.4	40.9	40.4	40.0	40.6	49.9	47.7	48.6	50.2	42.4	37.1
età media	49.5	49.6	49.1	49.0	49.0	47.8	47.1	47.6	47.3	46.7	45.9
maschi	73.1	73.4	73.5	72.7	74.0	73.0	74.6	74.6	75.4	75.0	75.4
femmine	26.9	26.6	26.5	27.3	26.0	27.0	25.4	25.4	24.6	25.0	24.6
nativi	74.7	74.4	73.8	75.6	77.0	72.6	75.2	74.7	77.9	79.4	80.5
non nativi	24.5	24.8	25.0	23.5	22.7	24.8	24.6	25.3	22.0	20.6	19.5
residenti area metropolitana	83.5	82.4	82.2	82.3	84.1	79.9	80.4	79.9	81.7	82.1	80.7
residenti fuori area metropolitana	14.6	16.6	15.4	15.2	14.8	19.2	17.2	19.7	18.3	16.3	19.1
senza fissa dimora (SFD)	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	2.3	2.5	2.0	1.8	4.3	3.8
decesso overdose	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2
abuso concomitante di sostanze illegali	21.1	19.9	19.5	20.9	18.8	16.7	17.6	29.2	28.9	32.6	35.4
di cui oppioidi	6.2	6.9	6.5	7.0	7.7	7.3	7.0	17.3	19.4	21.7	23.4
di cui cocaina	9.5	7.7	7.6	7.3	6.7	5.2	5.0	7.8	7.2	9.9	13.6
di cui cannabinoidi	3.3	3.6	3.3	3.6	2.8	2.7	2.6	4.1	2.8	3.3	4.7
di cui altre sostanze illegali	3.5	4.6	4.6	5.5	3.6	4.7	4.2	7.4	6.1	4.8	8.2
abuso concomitante di psicofarmaci**	5.1	4.5	4.5	5.0	6.4	4.6	3.7	8.7	6.6	5.2	7.9
Ospedale	19.6	20.6	22.0	22.9	21.5	21.9	22.0	21.2	22.7	22.7	21.0
Psichiatria	7.9	8.0	8.2	8.4	14.6	12.2	6.7	6.0	6.3	5.2	5.0
Pronto Soccorso	45.8	48.4	44.8	44.8	41.1	50.0	51.4	49.2	44.4	26.6	29.3
SERT	44.0	43.9	43.5	43.7	44.2	36.3	41.5	36.2	40.0	42.1	41.5
di cui anche Carcere	3.1	2.5	3.0	3.1	3.7	2.2	2.0	2.2	2.5	4.1	2.6
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.9	2.3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 22 - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	1171	1144	1101	1069	1147	1672	1384	1500	1424	1262	1086
età media	46,0	46,5	46,3	46,1	46,6	45,3	44,0	45,6	45,5	46,4	44,4
maschi	73,4	73,1	72,3	67,1	75,0	71,9	73,6	73,7	74,8	73,5	76,5
femmine	26,6	26,9	27,7	31,2	25,0	28,1	26,5	26,6	25,2	26,4	23,3
nativi	67,4	65,8	66,6	67,1	71,4	65,1	67,5	65,5	71,0	71,0	70,5
non nativi	30,9	32,6	31,2	31,2	28,2	31,1	33,4	33,7	31,5	33,5	29,8
residenti area metropolitana	72,1	70,7	70,6	70,7	74,6	70,8	70,1	70,7	71,6	71,4	68,9
residenti fuori area metropolitana	25,1	28,0	26,2	25,7	24,1	28,6	25,8	29,2	28,3	26,7	29,4
senza fissa dimora (SFD)	0,3	0,6	0,9	0,9	1,0	0,7	1,1	0,6	0,2	2,7	1,7
decesso overdose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
abuso concomitante di sostanze illegali	13,6	11,5	11,9	12,9	10,6	9,4	10,3	13,7	13,8	13,2	17,6
di cui oppioidi	1,1	1,0	1,3	1,3	2,1	2,3	0,9	3,1	4,7	4,8	5,2
di cui cocaina	6,5	5,2	4,5	3,6	3,4	2,5	3,1	2,8	3,4	4,7	5,3
di cui cannabinoidi	2,9	3,6	3,2	2,6	2,4	2,0	2,7	3,3	2,2	1,4	1,5
di cui altre sostanze illegali	2,5	2,7	3,0	5,1	2,9	3,6	3,6	5,1	5,5	4,4	8,3
abuso concomitante di psicofarmaci**	4,7	3,8	5,5	4,0	6,4	4,3	2,3	5,3	4,8	4,8	6,1
Ospedale	22,5	21,3	26,2	25,0	26,8	25,7	20,7	21,6	26,7	33,3	32,2
Psichiatria	2,1	2,4	0,2	2,9	3,7	7,4	3,0	3,3	3,6	3,4	4,8
Pronto Soccorso	64,4	67,7	64,5	64,2	60,9	69,2	71,7	73,9	68,0	55,9	57,8
SERT	18,7	17,8	20,2	15,8	16,8	13,3	15,8	13,3	14,3	17,4	16,3
di cui anche Carcere	3,5	1,2	2,2	2,7	2,3	0,9	1,2	0,7	1,1	0,9	2,5
di cui anche Unità Mobile Metadone	0,0	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,9	0,6

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 23 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	711	694	680	627	643	832	713	781	625	612	572
nuovi contatti	50.9	53.7	50.4	53.3	50.2	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	41.3	41.4	40.6	39.8	40.6	39.6	39.4	39.2	39.2	38.2	38.5
maschi	73.6	73.9	72.9	72.4	71.7	72.8	73.2	73.2	74.2	76.6	75.0
femmine	26.4	26.1	27.1	27.6	28.3	27.2	26.8	26.8	25.8	23.4	25.0
residenti area metropolitana	62.7	61.8	61.6	60.9	62.2	60.2	58.3	58.3	61.3	60.9	58.7
residenti fuori area metropolitana	34.0	35.9	34.4	33.3	35.1	37.7	33.7	41.1	38.7	35.3	40.7
senza fissa dimora (SFD)	4.4	4.0	3.4	4.1	3.3	3.4	4.5	3.2	3.7	6.5	4.7
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	19.7	17.4	16.8	18.8	15.7	12.9	13.5	20.6	18.2	23.5	27.8
di cui oppioidi	4.8	4.0	4.3	4.3	4.8	4.0	3.6	9.2	10.2	13.1	15.4
di cui cocaina	9.3	7.3	7.1	6.9	6.5	4.2	3.1	5.4	4.0	6.5	11.4
di cui cannabinoidi	4.8	4.2	3.5	3.7	3.0	3.0	3.6	4.4	1.8	1.5	3.3
di cui altre sostanze illegali	3.4	4.5	5.1	5.6	2.6	3.7	3.6	7.0	5.9	5.6	8.2
abuso concomitante di psicofarmaci**	5.5	3.2	4.6	4.5	5.4	3.8	3.5	5.6	4.2	3.4	8.6
Ospedale	15.3	17.1	17.6	18.3	17.0	16.3	13.7	13.6	15.8	15.7	14.0
Psichiatria	4.4	5.5	4.6	4.9	7.9	7.1	2.9	3.8	4.2	2.5	4.0
Pronto Soccorso	57.7	61.1	59.9	60.4	54.9	66.0	68.9	70.3	62.6	50.8	47.4
SERT	38.5	37.9	35.9	33.8	37.6	27.6	31.4	24.2	29.0	30.7	29.5
di cui anche Carcere	6.6	5.8	6.9	8.0	8.7	4.8	4.5	3.7	4.2	8.2	8.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	2.4	2.9	2.1	1.9	2.2	1.8	2.1	1.8	2.2	3.4	4.2
<b>Area provenienza</b>											
Europa Est	43.9	43.7	45.6	45.6	43.1	45.3	40.7	36.4	39.2	35.3	34.6
Altri paesi europei	8.3	8.4	8.1	6.4	8.4	7.2	8.1	8.5	8.2	11.8	12.1
Africa Mediterranea	24.3	22.2	22.2	26.8	25.3	25.5	25.8	23.6	25.1	30.4	27.1
Altra Africa	8.2	7.9	6.3	6.1	7.0	6.1	5.9	6.1	8.5	7.0	8.2
Asia	8.6	9.4	9.1	8.3	10.6	9.7	8.3	10.2	9.4	8.5	9.4
America Latina	5.9	7.3	7.6	5.6	4.8	5.0	4.8	6.4	5.9	5.9	6.3
USA e Canada	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.8	1.0	1.9
Altro	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	8.5	2.9	0.2	0.3
<b>Nazione</b>											
Marocco	17.4	17.6	15.0	19.3	18.4	18.6	19.1	17.7	18.4	20.8	17.5
Romania	17.3	14.1	17.1	17.9	16.6	20.4	16.8	15.1	13.3	12.4	12.2
Polonia	6.5	7.3	5.9	6.1	7.2	6.4	5.9	7.2	7.7	6.7	7.5
Ucraina	5.8	6.1	5.9	5.6	4.5	4.2	4.3	3.2	4.5	5.6	3.5
Tunisia	5.5	3.5	5.4	5.6	4.8	4.6	4.3	4.4	4.5	5.4	4.7

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 24 - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale*</b>	362	373	343	334	323	504	446	516	412	365	320
età media	38.3	39.3	38.5	37.5	37.7	37.9	37.5	37.7	37.4	36.4	36.8
maschi	75.1	75.3	72.6	75.4	75.9	74.8	74.2	74.2	74.0	76.7	75.3
femmine	24.9	24.7	27.4	24.6	24.1	25.2	25.8	25.8	26.0	23.3	24.7
residenti area metropolitana	53.0	53.1	52.5	54.2	52.9	52.8	52.0	51.4	57.0	56.7	75.3
residenti fuori area metropolitana	44.8	44.8	44.6	41.3	45.8	46.2	37.4	48.4	43.0	38.9	24.7
senza fissa dimora (SFD)	0.6	1.1	1.2	1.8	0.9	0.8	1.3	1.4	1.2	5.5	2.5
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0

abuso concomitante di sostanze illegali	14.9	12.9	12.0	14.1	10.2	7.7	9.6	13.0	10.7	11.0	13.8
di cui oppioidi	1.9	1.3	1.2	1.5	2.2	1.4	1.6	2.7	3.4	4.1	4.4
di cui cocaina	6.4	6.4	4.7	5.7	2.5	2.6	2.2	2.3	2.2	2.2	3.4
di cui cannabinoidi	4.4	4.3	3.5	3.0	3.4	1.6	2.9	3.9	1.0	0.5	0.6
di cui altre sostanze illegali	2.2	3.5	2.9	4.8	2.8	3.2	2.7	5.2	5.3	5.8	6.6
abuso concomitante di psicofarmaci**	5.0	2.4	4.7	3.0	4.6	3.0	2.2	3.7	3.4	2.5	6.9
Ospedale	15.2	16.4	16.3	16.2	17.3	15.5	10.5	11.8	16.3	18.6	18.1
Psichiatria	1.1	1.9	0.0	2.1	1.2	3.8	0.7	1.9	2.9	0.8	3.4
Pronto Soccorso	70.7	74.5	72.3	73.7	70.0	74.8	81.2	83.9	76.9	72.1	70.9
SERT	19.9	17.7	16.3	15.6	15.8	11.9	14.3	9.5	12.1	13.7	11.6
di cui anche Carcere	7.7	2.9	4.1	7.2	5.3	2.4	3.1	1.4	1.7	3.8	3.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	1.1	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8	0.9

<b>Area provenienza</b>											
Europa Est	45.0	43.2	43.1	43.4	44.6	45.8	43.0	37.6	41.0	36.4	37.2
Altri paesi europei	7.7	7.2	7.6	5.1	7.1	6.2	6.5	7.6	7.5	8.5	8.4
Africa Mediterranea	22.7	20.9	19.0	27.2	22.3	25.6	24.0	19.8	22.6	32.3	25.3
Altra Africa	9.1	7.8	8.5	6.0	6.5	5.8	4.7	6.2	9.0	6.8	9.7
Asia	9.9	11.0	11.7	10.5	13.9	10.5	8.3	10.9	9.5	9.9	11.3
America Latina	4.4	8.0	9.0	5.7	4.6	4.8	3.8	6.0	5.6	5.2	5.9
USA e Canada	1.1	1.6	1.2	1.5	0.9	1.2	1.3	0.4	0.5	0.5	2.2
Altro	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	8.3	11.6	4.4	0.3	0.0

<b>Nazione</b>											
Romania	20.2	13.9	17.2	17.7	18.3	22.4	18.4	17.4	14.1	14.5	15.0
Marocco	14.9	18.0	12.8	20.1	17.0	18.7	17.5	15.1	17.5	24.9	19.7
Tunisia	6.4	2.9	5.2	6.6	4.6	5.2	4.7	4.1	4.4	5.5	3.4
Ucraina	4.7	6.2	5.2	4.8	5.3	3.8	4.3	2.3	4.1	5.5	3.4
Polonia	3.6	7.0	5.2	3.6	5.9	5.0	4.7	6.6	7.0	6.3	9.1

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 25 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	28	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
nuovi contatti	92.9	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1	100.0
età media	16.2	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
maschi	42.9	55.2	54.5	58.3	64.7	61.4	65.0	57.7	70.3	64.7	78.9
femmine	57.1	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3	21.1
nativi	82.1	86.2	78.8	87.5	74.5	90.9	80.0	80.8	83.8	70.6	78.9
non nativi	17.9	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4	21.1
residenti area metropolitana	85.7	100.0	81.8	91.7	88.2	88.6	87.5	96.2	86.5	91.2	73.7
residenti fuori area metropolitana	14.3	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8	26.3
senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	14.3	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9	5.3
di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
di cui cocaina	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui cannabinoidi	10.7	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0	5.3
di cui altre sostanze illegali	3.6	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9	0.0
abuso concomitante di psicofarmaci**	0.0	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9	0.0
Ospedale	7.1	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6	15.8
Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pronto Soccorso	89.3	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4	84.2
SERT	3.6	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
di cui anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 26 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totali*	26	28	33	22	49	44	39	26	37	33	19
età media	11.0	15.9	15.7	15.9	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
maschi	57.7	53.6	54.5	54.5	63.3	61.4	64.1	57.7	70.3	63.6	78.9
femmine	100.0	46.4	45.5	45.5	36.7	38.6	35.9	42.3	29.7	36.4	21.1
nativi	80.8	89.3	78.8	90.9	73.5	90.9	79.5	80.8	83.8	69.7	78.9
non nativi	19.2	10.7	21.2	9.1	26.5	9.1	20.5	19.2	16.2	30.3	21.1
residenti area metropolitana	84.6	100.0	81.8	90.9	87.8	88.6	87.2	96.2	86.5	90.9	73.7
residenti fuori area metropolitana	15.4	0.0	15.2	9.1	12.2	11.4	12.8	3.8	13.5	9.1	26.3
senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	11.5	17.9	18.2	18.2	10.2	11.4	10.3	19.2	16.2	3.0	5.3
di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
di cui cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui cannabinoidi	7.7	10.7	18.2	4.5	2.0	6.8	5.1	7.7	13.5	0.0	5.3
di cui altre sostanze illegali	3.8	7.1	0.0	13.6	8.2	9.1	5.1	11.5	2.7	3.0	0.0
abuso concomitante di psicofarmaci**	0.0	10.7	3.0	0.0	4.1	11.4	0.0	3.8	2.7	6.1	0.0
Ospedale	7.7	3.6	9.1	9.1	6.1	4.5	10.3	11.5	5.4	18.2	15.8
Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pronto Soccorso	92.3	96.4	90.9	100.0	93.9	97.7	94.9	92.3	91.9	81.8	84.2
SERT	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	0.0
di cui anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 27 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1276	1229	1184	1167	1249	1216	1204	1116	1135	1252	1216
mai stato in precedenza al SERT	21.2	20.7	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	17.3	18.3
età media	48.8	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	47.9	47.7
maschi	73.2	72.6	72.6	71.1	74.3	72.9	73.4	74.6	74.8	73.8	73.1
femmine	26.8	27.4	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.4	25.2	26.2	26.9
nativi	78.5	78.5	79.3	81.7	80.6	80.8	81.3	83.1	84.1	85.0	86.1
non nativi	21.5	21.4	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	15.0	13.9
residenti area metropolitana	92.1	91.1	91.3	90.1	90.6	91.6	90.1	90.0	90.3	90.6	90.6
residenti fuori area metropolitana	7.2	8.0	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	9.1	8.5
senza fissa dimora (SFD)	4.6	5.0	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	4.0	3.4	3.5	2.6
decesso overdose	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
alcol primaria	79.3	84.1	82.3	82.9	83.8	85.0	84.6	84.4	82.8	85.1	81.5
alcol secondaria	17.6	14.6	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	13.9	10.0
abuso concomitante di sostanze illegali	30.6	29.4	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	38.4	26.1	29.7	22.5
di cui eroina	9.0	9.4	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	11.3	11.9
di cui cocaina	13.0	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.8	6.0	6.8	7.1
di cui cannabinoidi	3.7	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.4
di cui GHB	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
di cui crack	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui amfetamine	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
di cui ketamina	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
di cui ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	1.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9
tramadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
codeina	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
anche gioco	1.1	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.5	0.5
Ospedale	7.2	9.8	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.5	10.9
Psichiatria	7.6	8.3	8.5	9.0	14.7	14.6	7.6	7.6	6.4	5.2	4.9
Pronto Soccorso	13.8	16.8	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2	8.4
anche Carcere	6.3	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2	2.2
anche Unità Mobile Metadone	1.3	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.7	0.7

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 28 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Total*	270	254	224	209	264	255	267	227	209	217	223
età media	44.2	45.9	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.6	44.6
maschi	74.8	71.3	73.7	67.5	73.1	71.0	68.5	74.0	70.8	78.3	77.6
femmine	25.2	28.7	26.3	32.5	26.9	29.0	31.5	26.0	29.2	21.7	22.4
nativi	68.1	67.3	67.4	71.3	75.8	72.2	70.0	76.7	75.6	74.2	81.6
non nativi	31.9	32.7	32.6	28.7	24.2	27.5	30.0	23.3	24.4	25.8	18.4
residenti area metropolitana	85.2	86.2	83.5	83.7	84.5	90.6	85.4	85.5	87.6	78.8	87.0
residenti fuori area metropolitana	14.1	12.6	15.2	14.8	14.4	9.0	12.7	14.1	12.4	19.8	11.2
senza fissa dimora (SFD)	2.6	3.1	5.8	5.7	4.2	4.7	8.6	5.3	3.8	6.0	1.3
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
alcol primaria	79.3	90.9	85.7	86.1	88.3	87.8	88.0	89.9	88.5	88.9	88.3
alcol secondaria	15.6	6.3	9.8	13.4	11.0	11.8	11.6	10.1	11.5	8.3	6.7
abuso concomitante di sostanze illegali	28.5	24.4	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	27.8	20.6	23.0	18.4
di cui eroina	1.5	2.0	1.3	1.4	2.3	4.3	3.4	6.2	5.3	5.5	7.2
di cui cocaina	17.0	11.4	10.7	12.9	11.7	9.4	9.4	7.9	7.7	7.8	9.0
di cui cannabinoidi	5.9	4.7	3.1	2.9	5.3	3.1	6.7	4.8	3.3	3.2	3.1
di cui GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui crack	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui amfetamine	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	1.5	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.5	0.9	0.9
tramadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
codeina	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anche gioco	0.0	0.4	1.8	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.0	0.0	1.8
Ospedale	7.8	12.6	12.1	12.4	11.7	12.5	15.0	16.3	15.3	11.1	18.4
Psichiatria	5.2	6.7	1.3	6.2	11.0	13.7	6.7	10.6	5.3	6.9	5.4
Pronto Soccorso	12.6	19.3	13.4	18.2	13.6	17.6	19.5	20.7	17.7	9.2	13.5
anche Carcere	14.1	6.7	11.2	12.0	13.3	6.7	6.4	3.5	4.3	9.7	4.5
anche Unità Mobile Metadone	0.4	2.4	3.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.8	2.4	2.8	0.4

\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 29 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1330	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	791	858
nuovi contatti	56.7	57.2	58.2	57.4	60.1	65.0	65.0	70.8	72.3	78.8	71.2
età media	47.9	47.7	46.5	46.2	46.1	45.1	43.9	45.3	43.7	42.4	42.3
maschi	72.9	75.1	74.8	73.0	73.9	72.9	73.6	75.1	75.3	72.2	75.8
femmine	27.1	24.9	25.2	27.0	26.1	27.1	26.4	24.9	24.7	27.8	24.2
nativi	67.7	67.5	64.9	67.1	69.5	62.7	66.9	63.9	68.9	60.7	68.4
non nativi	30.8	31.3	33.4	31.7	30.4	32.7	33.0	36.1	31.1	39.3	31.6
residenti area metropolitana	73.4	73.2	72.3	73.7	74.6	69.0	70.7	69.7	71.2	69.3	68.5
residenti fuori area metropolitana	23.5	26.0	24.2	22.0	24.2	30.0	25.1	30.0	28.8	28.2	31.4
senza fissa dimora (SFD)	1.4	1.5	1.2	0.8	1.0	1.4	2.1	1.2	1.0	3.5	1.2
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	16.4	16.4	16.6	20.2	14.2	13.7	15.7	20.7	21.8	15.2	23.7
di cui oppioidi	3.1	4.7	4.0	5.2	4.6	4.7	4.8	8.7	12.2	5.8	6.4
di cui cocaina	7.5	5.3	5.2	5.0	5.1	3.5	3.6	4.4	4.6	4.2	4.5
di cui cannabinoidi	3.0	3.6	3.4	3.8	2.3	2.7	2.3	3.0	2.8	1.3	2.0
di cui altre sostanze illegali	5.0	6.4	6.5	9.9	4.5	7.0	6.8	8.8	8.5	6.7	15.0
abuso concomitante di psicofarmaci**	8.4	7.6	7.9	8.1	12.4	7.1	5.5	8.9	7.9	6.1	12.4
Ospedale	12.5	15.7	14.7	14.7	13.7	13.1	14.7	14.7	15.3	16.1	19.2
Psichiatria	2.9	3.4	2.5	3.8	6.4	4.7	3.4	3.2	3.3	3.3	4.2
SERT	13.2	15.3	12.8	13.3	13.3	10.9	14.9	11.5	12.2	11.4	11.9
di cui anche Carcere	0.5	0.5	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	0.5	1.0	0.5	0.3
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.8	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.6	0.1	0.3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 30 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale*</b>	<b>754</b>	<b>775</b>	<b>710</b>	<b>686</b>	<b>698</b>	<b>1091</b>	<b>968</b>	<b>1076</b>	<b>910</b>	<b>623</b>	<b>611</b>
età media	43.8	43.4	42.8	42.5	42.8	42.3	40.6	43.1	41.7	40.9	40.3
maschi	72.7	74.3	72.8	70.8	74.1	72.1	73.6	74.3	74.5	71.3	76.3
femmine	27.3	25.7	27.2	29.2	25.9	27.9	26.4	25.7	25.5	28.7	23.7
nativi	63.5	62.2	62.1	62.4	67.5	58.7	62.5	59.8	65.2	57.8	62.8
non nativi	34.0	35.9	34.9	35.9	32.4	34.6	37.4	40.2	34.8	42.2	37.2
residenti area metropolitana	64.2	62.7	63.2	64.9	68.1	61.6	64.2	63.0	66.4	65.2	62.8
residenti fuori area metropolitana	31.8	36.3	32.5	30.5	31.2	37.7	30.7	36.8	33.6	31.9	37.0
senza fissa dimora (SFD)	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	2.7	0.2
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	10.6	9.9	11.3	13.6	8.2	8.0	9.7	13.0	12.9	9.0	16.9
di cui oppioidi	0.7	0.9	0.8	1.2	1.4	1.0	0.4	2.4	4.0	1.9	1.6
di cui cocaina	4.4	3.1	2.8	2.8	1.7	1.6	2.3	1.9	1.8	1.8	1.8
di cui cannabinoidi	2.4	3.4	3.4	2.5	1.9	1.8	2.2	2.8	2.1	1.1	1.0
di cui altre sostanze illegali	2.8	3.1	3.9	6.7	2.9	4.5	5.0	6.0	6.8	5.1	12.3
abuso concomitante di psicofarmaci**	6.0	4.9	6.9	5.5	9.5	5.0	2.9	5.5	4.9	3.7	7.2
Ospedale	6.8	7.6	7.0	6.6	7.6	6.7	7.6	7.2	9.9	11.4	11.9
Psichiatria	0.3	0.3	0.0	0.7	0.9	1.6	1.0	1.0	1.1	0.6	1.6
SERT	3.3	3.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.6	3.7	2.5	2.7	3.4
di cui anche Carcere	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 31 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	569	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
nuovi contatti	46.4	42.3	48.2	43.7	50.5	52.4	46.3	48.6	60.7	65.5	55.5
età media	55.9	56.3	56.4	56.8	56.9	55.7	55.5	55.7	56.7	56.1	55.5
maschi	73.5	71.4	72.7	74.5	78.0	75.8	76.9	75.8	77.2	77.1	75.7
femmine	26.5	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3
nativi	80.8	79.4	79.5	80.7	81.9	81.3	84.0	83.8	84.6	85.8	87.0
non nativi	19.2	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0
residenti area metropolitana	91.7	91.7	90.8	90.2	91.4	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7	87.9
residenti fuori area metropolitana	7.9	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.9
senza fissa dimora (SFD)	1.9	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2	1.6
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
abuso concomitante di sostanze illegali	16.3	18.5	17.5	15.7	14.8	14.7	12.7	21.7	20.0	14.6	16.4
di cui oppioidi	5.3	6.2	6.7	5.1	5.9	8.3	3.8	11.5	11.8	6.2	8.1
di cui cocaina	7.0	5.5	5.8	4.7	3.8	3.7	3.1	4.4	3.3	3.3	4.9
di cui cannabinoidi	3.0	4.0	3.8	3.4	2.1	1.9	2.0	2.6	1.2	1.8	2.0
di cui altre sostanze illegali	5.6	7.5	6.7	5.9	6.3	6.3	4.7	7.3	7.0	6.5	8.5
abuso concomitante di psicofarmaci**	6.2	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	10.1	6.7	6.7	8.5
Pronto soccorso	29.2	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8	26.9
Psichiatria	3.5	6.2	4.2	6.1	9.9	7.9	4.4	6.9	5.0	4.1	6.4
SERT	16.2	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6	21.5
di cui anche Carcere	0.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.9	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 32 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	264.0	244.0	289.0	267.0	307.0	386.0	295.0	318.0	391.0	443.0	341.0
età media	56.4	58.6	57.2	57.4	58.6	55.9	57.1	56.4	57.4	57.2	55.3
maschi	73.5	71.3	69.6	70.4	79.2	74.9	74.6	73.9	77.7	76.1	76.0
femmine	26.5	28.7	30.4	29.6	20.8	25.1	25.4	26.1	22.3	23.9	24.0
nativi	79.2	75.0	79.9	79.4	81.4	79.8	83.1	80.8	82.9	84.7	83.0
non nativi	20.8	25.0	19.4	20.2	18.2	20.2	15.9	19.2	17.1	15.3	17.0
residenti area metropolitana	90.2	86.9	87.2	84.6	87.0	86.8	87.8	84.6	88.5	88.9	82.1
residenti fuori area metropolitana	9.5	12.7	12.5	14.2	12.7	13.0	12.2	15.4	11.5	10.2	17.6
senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.0	1.1	0.6
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	9.8	6.1	10.0	8.6	8.8	6.7	5.4	8.5	11.0	5.6	9.1
di cui oppioidi	2.3	0.4	1.7	1.1	2.6	3.6	0.3	1.3	3.6	0.7	2.6
di cui cocaina	3.4	2.5	3.1	1.1	1.3	1.3	0.7	1.3	1.5	0.7	2.1
di cui cannabinoidi	0.4	2.5	2.4	2.6	2.0	0.8	0.7	2.5	0.8	1.6	0.9
di cui altre sostanze illegali	3.0	2.5	2.8	3.4	3.6	2.1	3.1	3.5	4.9	3.4	3.8
abuso concomitante di psicofarmaci**	3.8	3.3	6.6	2.6	2.9	4.7	2.4	5.7	4.3	3.6	4.4
Pronto soccorso	19.3	24.2	17.3	16.9	17.3	18.9	25.1	24.5	23.0	16.0	21.4
Psichiatria	0.8	0.8	0.0	1.9	1.3	3.9	1.7	2.8	3.3	1.6	4.4
SERT	4.2	7.8	4.8	5.2	6.8	4.4	7.5	9.4	6.9	5.4	8.8
di cui anche Carcere	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 33 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	229	224	224	224	414	409	195	185	179	155	147
nuovi contatti	10.9	12.5	0.9	13.8	10.4	30.3	21.5	26.5	28.5	27.7	35.4
età media	51.5	50.0	49.6	49.8	50.5	48.6	48.6	47.7	48.9	48.1	47.0
maschi	68.6	63.8	64.7	64.7	65.0	64.5	62.1	65.4	66.5	71.0	68.7
femmine	31.4	36.2	35.3	35.3	35.0	35.5	37.9	34.6	33.5	29.0	31.3
nativi	85.2	81.3	82.1	83.0	86.2	84.4	88.7	83.2	84.9	89.0	84.4
non nativi	13.5	17.0	13.8	13.8	12.3	14.4	10.8	16.2	14.5	9.7	15.6
residenti area metropolitana	92.6	94.6	92.0	90.6	94.4	93.6	93.8	93.5	91.1	91.0	90.5
residenti fuori area metropolitana	4.8	3.6	3.6	5.4	3.9	5.4	5.6	5.9	8.4	6.5	8.2
senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.4	0.4	1.2	1.0	1.0	1.6	0.0	1.3	0.0
decesso overdose	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	13.5	14.7	14.7	18.3	16.4	19.8	21.0	28.6	24.6	20.0	18.4
di cui oppioidi	3.5	4.0	3.6	4.5	4.1	5.6	5.6	13.0	13.4	9.7	8.8
di cui cocaina	5.7	5.8	6.7	6.3	7.0	6.8	6.7	5.9	5.6	7.7	8.2
di cui cannabinoidi	3.9	2.7	4.9	5.4	3.4	4.4	5.1	3.8	2.8	1.9	2.7
di cui altre sostanze illegali	1.7	4.0	3.6	4.9	4.6	7.3	5.6	10.3	7.3	3.9	8.8
abuso concomitante di psicofarmaci**	3.1	3.6	1.8	4.0	7.0	7.6	6.2	11.9	7.3	7.1	8.8
Ospedale	8.7	16.1	11.2	16.5	14.5	14.2	14.4	24.3	17.9	18.1	26.5
Pronto soccorso	17.0	20.5	13.4	20.1	17.9	19.3	25.6	26.5	22.9	16.8	24.5
SERT	42.4	45.5	45.1	46.9	44.4	43.5	47.2	45.9	40.8	41.9	40.1
di cui anche Carcere	0.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 34 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	25	28	2	31	43	124	42	49	51	43	52
età media	46.1	44.9	29.5	47.5	49.5	46.7	46.7	45.7	47.6	48.8	44.3
maschi	80.0	64.3	100.0	71.0	58.1	61.3	66.7	57.1	66.7	74.4	71.2
femmine	20.0	35.7	0.0	29.0	41.9	38.7	33.3	42.9	33.3	25.6	28.8
nativi	80.0	64.3	0.0	61.3	81.4	82.3	92.9	77.6	74.5	90.7	78.8
non nativi	16.0	25.0	0.0	22.6	9.3	15.3	7.1	20.4	23.5	7.0	21.2
residenti area metropolitana	88.0	85.7	0.0	71.0	86.0	86.3	92.9	93.9	80.4	88.4	86.5
residenti fuori area metropolitana	4.0	3.6	0.0	9.7	4.7	11.3	7.1	4.1	17.6	7.0	11.5
senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
abuso concomitante di sostanze illegali	16.0	7.1	0.0	12.9	11.6	16.9	21.4	16.3	19.6	11.6	5.8
di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.8	2.0	5.9	4.7	0.0
di cui cocaina	4.0	3.6	0.0	0.0	4.7	2.4	7.1	2.0	2.0	7.0	0.0
di cui cannabinoidi	8.0	0.0	0.0	3.2	4.7	5.6	4.8	2.0	5.9	2.3	1.9
di cui altre sostanze illegali	0.0	3.6	0.0	6.5	2.3	6.5	9.5	8.2	9.8	0.0	3.8
abuso concomitante di psicofarmaci**	8.0	0.0	0.0	3.2	0.0	8.1	4.8	6.1	5.9	2.3	5.8
Ospedale	8.0	7.1	0.0	16.1	9.3	12.1	11.9	18.4	25.5	16.3	28.8
Pronto soccorso	8.0	7.1	0.0	16.1	14.0	14.5	23.8	22.4	19.6	9.3	19.2
SERT	36.0	17.9	0.0	19.4	11.6	23.4	33.3	30.6	19.6	27.9	23.1
di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 35 - Gioco problematico\*. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2019**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	104	89	92	103	128	123	97	52	25	20	22
età media	46.7	49.6	46.4	47.3	46.6	46.1	48.5	51.1	53.6	47.8	46.3
maschi	80.8	78.7	82.6	81.6	85.9	79.7	76.3	73.1	56.0	90.0	86.4
femmine	19.2	21.3	17.4	18.4	14.1	20.3	23.7	26.9	44.0	10.0	13.6
nativi	85.6	91.0	85.9	86.4	82.8	83.7	86.6	88.5	84.0	90.0	90.9
non nativi	14.4	9.0	14.1	13.6	17.2	16.3	13.4	11.5	16.0	10.0	9.1
residenti area metropolitana	92.3	95.5	92.4	95.1	93.0	96.7	91.8	96.2	100.0	95.0	95.5
residenti fuori area metropolitana	6.7	4.5	5.4	4.9	6.3	3.3	7.2	3.8	0.0	5.0	4.5
primo contatto SERT	90.4	95.5	98.9	90.3	77.3	71.5	74.2	59.6	52.0	65.0	63.6
primo contatto Ospedale	6.7	2.2	1.1	0.0	2.3	4.9	2.1	13.5	4.0	5.0	0.0
primo contatto Psichiatria	2.9	2.2	0.0	9.7	20.3	23.6	23.7	26.9	44.0	30.0	36.4
anche alcol	7.7	4.5	6.5	1.9	5.5	10.6	13.4	5.8	8.0	15.0	18.2
anche sostanze illegali	3.8	6.7	5.4	6.8	8.6	7.3	12.4	7.7	12.0	20.0	13.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 36 - Gioco problematico\*. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2019

	Totale*		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
			233	186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
<b>sesso</b>	% femmine		20.6	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
<b>nuovo/già in carico</b>	% nuovi		38.6	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
<b>età media</b>	all'ingresso		47.0	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
<b>nazionalità</b>	% non nativi		6.9	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
<b>residenza</b>	% fuori area metropolitana		5.1	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
<b>stato civile</b>	% celibe/nubile		41.2	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato		31.8	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo		12.1	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
<b>titolo di studio</b>	% elementari		5.2	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore		48.1	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale		5.2	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore		26.6	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario		7.7	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto		7.3	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
<b>condizione lavorativa</b>	% disoccupato/in cerca di occupazione		13.7	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente		61.8	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione		22.3	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente		0.9	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
<b>presa in carico</b>	durata media in mesi		16.5	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
<b>esito programma</b>	% completato		7.3	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata		1.3	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura		0.4	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono		9.4	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio		15.5	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso		0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso		66.1	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
<b>altre dipendenze</b>	% altre dipendenze		1.7	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	Di cui % alcol		1.3	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	Di cui % cocaina		0.4	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	Di cui % eroina		0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
	Di cui % tabacco		0	0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
	Di cui % altro		0	0	0.5	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ex utente Sert Tossicodipendente		1.3	2.7	4.0	3.8	2.9	3.4	3.6	-	-	-	-
	ex utente Sert Alcolista		1.3	1.6	2.5	2.2	2.3	2.8	2.4	-	-	-	-

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

**Tab. 37 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2019**

**Tab. 38 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2019**

Totale											
incid	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	1.14	1.08	1.04	1.02	1.15	1.62	1.39	1.42	1.44	1.30	1.09
illegali	0.88	0.73	0.71	0.73	0.72	0.90	0.97	0.77	0.88	0.88	0.78
oppiodi	0.18	0.13	0.20	0.20	0.21	0.31	0.17	0.25	0.35	0.31	0.32
cocaina	0.38	0.31	0.31	0.22	0.24	0.23	0.23	0.20	0.25	0.22	0.19
gioco	0.14	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02

Maschi											
incid	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	1.65	1.59	1.47	1.39	1.70	2.27	1.97	2.05	2.17	1.91	1.62
illegali	1.34	1.14	1.12	1.07	1.14	1.27	1.36	1.17	1.31	1.27	1.15
oppiodi	0.27	0.19	0.29	0.26	0.32	0.41	0.24	0.37	0.53	0.49	0.48
cocaina	0.62	0.53	0.52	0.37	0.39	0.39	0.41	0.36	0.41	0.39	0.31
gioco	0.24	0.16	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.10	0.04	0.04	0.04

Femmine											
incid	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	0.65	0.59	0.62	0.65	0.62	0.99	0.81	0.80	0.72	0.69	0.55
illegali	0.44	0.33	0.30	0.40	0.30	0.52	0.58	0.38	0.45	0.49	0.41
oppiodi	0.10	0.07	0.11	0.14	0.11	0.22	0.09	0.14	0.17	0.13	0.16
cocaina	0.14	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.06	0.05	0.08	0.05	0.07
gioco	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00

Nativi											
incid	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	0.97	0.89	0.86	0.83	1.01	1.35	1.15	1.12	1.19	1.07	0.90
illegali	0.78	0.66	0.68	0.66	0.67	0.84	0.92	0.71	0.84	0.83	0.74
oppiodi	0.15	0.11	0.18	0.18	0.20	0.30	0.16	0.25	0.34	0.29	0.31
cocaina	0.34	0.29	0.31	0.20	0.23	0.24	0.22	0.18	0.25	0.21	0.18
gioco	0.14	0.11	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	0.07	0.03	0.03	0.02

Non Nativi											
incid	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	2.15	2.18	2.05	2.09	2.00	3.19	2.73	3.25	3.08	2.93	2.55
illegali	1.47	1.14	0.89	1.13	0.98	1.22	1.28	1.15	1.16	1.26	1.10
oppiodi	0.35	0.22	0.31	0.27	0.29	0.39	0.23	0.28	0.44	0.42	0.39
cocaina	0.60	0.45	0.32	0.34	0.30	0.20	0.29	0.35	0.27	0.28	0.22
gioco	0.13	0.08	0.12	0.11	0.18	0.23	0.13	0.01	0.05	0.01	0.02

Tab. 39 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2019.

Prevalenza	Alcol			Illegali			Gioco		
	12-64 anni								
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>									
CASALECCHIO DI RENO	<b>4.92</b>	<b>1.98</b>	<b>3.44</b>	<b>6.02</b>	<b>1.65</b>	<b>3.82</b>	<b>0.66</b>	<b>0.19</b>	<b>0.42</b>
MONTE SAN PIETRO	4.45	2.17	3.29	5.41	1.67	3.50	0.35	0.17	0.26
SASSO MARCONI	3.28	2.42	2.85	5.19	0.81	2.98	0.27	0.00	0.14
VALSAMOGGIA	2.94	1.48	2.21	7.55	1.48	4.53	0.21	0.42	0.32
ZOLA PREDOSA	6.28	1.57	3.96	6.00	1.76	3.91	1.14	0.29	0.72
	5.99	2.39	4.17	6.48	2.07	4.25	0.97	0.00	0.48
<b>Distretto Pianura Ovest</b>									
ANZOLA DELL'EMILIA	<b>5.09</b>	<b>2.11</b>	<b>3.61</b>	<b>6.74</b>	<b>1.49</b>	<b>4.13</b>	<b>0.75</b>	<b>0.15</b>	<b>0.45</b>
CALDERARA DI RENO	4.92	2.01	3.48	8.12	1.01	4.60	0.74	0.00	0.37
CREVALCORE	4.50	2.01	3.25	7.20	1.11	4.14	0.22	0.00	0.11
SALA BOLOGNESE	5.48	0.89	3.20	7.89	1.11	4.53	1.53	0.67	1.10
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	4.16	1.06	2.62	3.81	0.35	2.10	1.04	0.00	0.52
SANT'AGATA BOLOGNESE	5.80	3.45	4.63	5.80	2.37	4.09	0.54	0.11	0.32
	4.19	0.82	2.57	8.38	1.64	5.13	0.76	0.00	0.39
<b>Distretto Pianura Est</b>									
ARGELATO	<b>5.24</b>	<b>1.94</b>	<b>3.58</b>	<b>6.79</b>	<b>1.79</b>	<b>4.28</b>	<b>0.65</b>	<b>0.11</b>	<b>0.38</b>
BARICELLA	7.35	0.92	4.14	8.27	2.15	5.21	0.61	0.00	0.31
BENTIVOGLIO	4.12	3.39	3.76	7.42	1.70	4.60	0.41	0.42	0.42
BUDRIO	4.27	2.66	3.46	7.47	3.73	5.60	0.00	0.00	0.00
CASTELLO D'ARGILE	5.63	2.30	3.96	5.63	1.97	3.79	0.99	0.00	0.49
CASTEL MAGGIORE	5.51	1.80	3.71	8.48	1.35	5.02	1.27	0.45	0.87
CASTENASO	4.01	3.05	3.52	4.34	1.77	3.03	0.17	0.00	0.08
GALLIERA	4.10	1.76	2.91	7.17	0.59	3.81	1.02	0.00	0.50
GRANAROLO EMILIA	4.72	1.09	2.94	7.87	0.00	4.01	0.52	0.00	0.27
MALALBERGO	4.85	1.68	3.25	8.97	1.20	5.06	0.48	0.24	0.36
MINERBIO	5.94	1.62	3.76	5.94	1.95	3.93	0.33	0.32	0.33
MOLINELLA	5.68	1.01	3.35	6.68	4.37	5.53	1.00	0.00	0.50
PIEVE DI CENTO	4.64	2.36	3.51	7.74	1.96	4.87	0.58	0.00	0.29
SAN GIORGIO DI PIANO	6.60	2.21	4.41	4.84	3.54	4.19	0.44	0.00	0.22
SAN PIETRO IN CASALE	5.88	0.33	3.04	5.54	1.32	3.38	0.35	0.33	0.34
	6.38	1.69	4.05	7.56	0.72	4.17	1.18	0.24	0.72
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>									
LOIANO	<b>3.60</b>	<b>1.50</b>	<b>2.54</b>	<b>7.03</b>	<b>1.73</b>	<b>4.36</b>	<b>0.44</b>	<b>0.04</b>	<b>0.24</b>
MONGHIDORO	6.27	2.22	4.30	9.75	5.91	7.89	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	6.41	2.67	4.63	10.41	0.89	5.90	0.00	0.89	0.42
OZZANO DELL'EMILIA	0.46	2.88	1.64	6.42	1.92	4.22	0.46	0.00	0.23
PIANORO	4.60	1.30	2.94	7.22	1.30	4.25	0.44	0.00	0.22
SAN LAZZARO DI SAVENA	2.51	1.59	2.05	7.52	1.94	4.71	0.36	0.00	0.18
	3.70	1.04	2.33	6.00	1.32	3.60	0.60	0.00	0.29
<b>Distretto di Porretta</b>									
ALTO RENO TERME	<b>6.24</b>	<b>2.39</b>	<b>4.35</b>	<b>5.59</b>	<b>1.99</b>	<b>3.82</b>	<b>0.77</b>	<b>0.11</b>	<b>0.45</b>
CAMUGNANO	8.30	1.83	5.05	2.77	2.29	2.53	0.92	0.00	0.46
CASTEL D'AIANO	3.55	0.00	1.79	1.78	7.21	4.47	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	8.26	0.00	4.31	3.31	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	7.83	0.93	4.50	0.87	0.93	0.90	0.87	0.00	0.45
GAGGIO MONTANO	3.42	1.76	2.60	7.41	1.76	4.63	1.14	0.00	0.58
GRIZZANA MORANDI	6.23	2.55	4.41	2.49	1.91	2.20	0.62	0.00	0.31
LIZZANO IN BELVEDERE	6.81	3.25	5.09	6.81	1.62	4.31	0.76	0.00	0.39
MARZABOTTO	2.93	0.00	1.48	2.93	1.49	2.22	0.00	0.00	0.00
MONZUNO	7.45	3.98	5.72	10.08	3.10	6.60	0.88	0.88	0.88
SAN BENED. VAL DI SAMBRO	4.06	2.93	3.52	4.51	1.47	3.05	0.90	0.00	0.47
VERGATO	4.23	2.31	3.31	7.05	2.31	4.79	1.41	0.00	0.74
	8.43	3.29	5.89	8.43	1.23	4.88	0.40	0.00	0.20
<b>Distretto Bologna città</b>									
BOLOGNA	<b>4.82</b>	<b>1.85</b>	<b>3.31</b>	<b>9.04</b>	<b>2.65</b>	<b>5.80</b>	<b>0.49</b>	<b>0.11</b>	<b>0.30</b>
<b>Area metropolitana</b>									
	<b>4.92</b>	<b>1.91</b>	<b>3.40</b>	<b>7.62</b>	<b>2.14</b>	<b>4.86</b>	<b>0.58</b>	<b>0.12</b>	<b>0.35</b>

**Tab. 40 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2019.**

Incidenza	Alcol			Illegali			Gioco		
	12-64 anni								
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>									
CASALECCHIO DI RENO	1.80	0.84	1.32	1.20	0.30	0.75	0.33	0.11	0.22
MONTE SAN PIETRO	1.57	1.08	1.32	0.87	0.50	0.68	0.17	0.17	0.17
SASSO MARCONI	1.09	1.08	1.09	1.37	0.00	0.68	0.27	0.00	0.14
VALSAMOGGIA	1.47	0.42	0.95	1.26	0.00	0.63	0.00	0.21	0.11
ZOLA PREDOSA	2.48	0.78	1.64	1.33	0.20	0.77	0.67	0.10	0.39
	1.78	0.64	1.20	1.46	0.48	0.96	0.32	0.00	0.16
<b>Distretto Pianura Ovest</b>									
ANZOLA DELL'EMILIA	1.40	0.84	1.12	0.90	0.25	0.58	0.22	0.00	0.11
CALDERARA DI RENO	1.48	0.75	1.12	0.74	0.25	0.50	0.25	0.00	0.12
CREVALCORE	1.12	0.45	0.78	1.57	0.22	0.90	0.00	0.00	0.00
SALA BOLOGNESE	2.19	0.67	1.44	1.10	0.67	0.88	0.22	0.00	0.11
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	0.69	0.35	0.52	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
SANT'AGATA BOLOGNESE	1.61	1.40	1.51	0.86	0.11	0.48	0.43	0.00	0.22
	0.38	0.41	0.39	0.38	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
<b>Distretto Pianura Est</b>									
ARGELATO	1.70	0.65	1.18	1.22	0.41	0.81	0.30	0.02	0.16
BARICELLA	3.06	0.31	1.69	2.45	0.61	1.53	0.61	0.00	0.31
BENTIVOGLIO	0.41	0.85	0.63	1.24	0.85	1.05	0.00	0.42	0.21
BUDRIO	1.60	1.07	1.33	2.67	1.07	1.87	0.00	0.00	0.00
CASTELLO D'ARGILE	2.48	1.15	1.81	0.99	0.99	0.99	0.33	0.00	0.16
CASTEL MAGGIORE	1.70	1.35	1.53	1.27	0.90	1.09	0.42	0.00	0.22
CASTENASO	0.84	0.48	0.66	0.84	0.32	0.57	0.00	0.00	0.00
GALLIERA	1.43	0.78	1.10	0.82	0.00	0.40	0.20	0.00	0.10
GRANAROLO EMILIA	0.52	0.55	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALALBERGO	2.18	0.72	1.44	1.94	0.00	0.96	0.48	0.00	0.24
MINERBIO	2.31	0.65	1.47	0.66	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
MOLINELLA	2.00	0.34	1.17	1.00	1.01	1.01	0.67	0.00	0.34
PIEVE DI CENTO	1.16	0.39	0.78	0.77	0.00	0.39	0.39	0.00	0.19
SAN GIORGIO DI PIANO	0.88	0.44	0.66	2.20	0.88	1.54	0.44	0.00	0.22
SAN PIETRO IN CASALE	2.42	0.00	1.18	1.04	0.00	0.51	0.35	0.00	0.17
	1.89	0.72	1.31	1.42	0.24	0.83	0.47	0.00	0.24
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>									
LOIANO	1.04	0.59	0.81	1.12	0.51	0.81	0.16	0.00	0.08
MONGHIDORO	2.09	1.48	1.79	0.70	3.70	2.15	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	2.40	2.67	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OZZANO DELL'EMILIA	0.00	0.96	0.47	1.38	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
PIANORO	1.31	0.43	0.87	1.31	0.65	0.98	0.22	0.00	0.11
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.54	0.35	0.44	0.72	0.35	0.53	0.18	0.00	0.09
	1.10	0.38	0.73	1.40	0.28	0.83	0.20	0.00	0.10
<b>Distretto di Porretta</b>									
ALTO RENO TERME	2.90	1.08	2.01	1.04	0.80	0.92	0.38	0.06	0.22
CAMUGNANO	4.15	0.91	2.53	0.46	0.46	0.46	0.92	0.00	0.46
CASTEL D'AIANO	1.78	0.00	0.89	0.00	5.41	2.68	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	1.65	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	6.09	0.93	3.60	0.87	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	2.28	0.59	1.45	1.71	0.59	1.16	0.57	0.00	0.29
GRIZZANA MORANDI	2.49	1.91	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	2.27	1.62	1.96	1.51	0.00	0.78	0.76	0.00	0.39
MARZABOTTO	2.93	0.00	1.48	1.47	1.49	1.48	0.00	0.00	0.00
MONZUNO	1.75	0.88	1.32	1.75	1.33	1.54	0.44	0.44	0.44
SAN BENED. VAL DI SAMBRO	2.25	1.47	1.88	0.45	0.49	0.47	0.00	0.00	0.00
VERGATO	2.11	1.54	1.84	2.11	2.31	2.21	0.70	0.00	0.37
	4.02	1.23	2.64	1.20	0.41	0.81	0.40	0.00	0.20
<b>Distretto Bologna città</b>									
BOLOGNA	1.58	0.50	1.03	1.61	0.46	1.03	0.18	0.05	0.11
<b>Area metropolitana</b>	<b>1.65</b>	<b>0.65</b>	<b>1.14</b>	<b>1.34</b>	<b>0.44</b>	<b>0.88</b>	<b>0.24</b>	<b>0.04</b>	<b>0.14</b>

**Tab. 41 - Stima del sommerso. Periodo 2009-2019**

**Tab. 42 - Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna.  
Periodo 2009-2019\***

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KG EROINA	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9	3.9	31.5	3.5	27.4
KG COCAINA	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7	54.4	46.3	12.8	40.0
KG HASICHS	506.8	66.7	140.7	157.7	38.2	41.8	63.1	69.5	546.3	94.2	90.5
KG MARIJUANA	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2	46.8	641.2	163.4	128.2
operazioni	544	483	616	574	652	489	328	448	411	273	448
denunce	825	696	888	709	616	606	398	572	574	477	480
arresti	708	573	790	621	542	493	308	471	488	384	325
minori denunciati	23	14	17	11	12	9	15	16	13	15	16
non nativi denunciati	451	385	569	461	410	375	286	466	447	329	296

\*fonte Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

**Tab.43 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2019**

	Decessi per overdose territorio area metropolitana di Bologna								Accessi al PS per overdose							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	16	23	13	17	17	11	20	23	113	112	98	86	85	69	50	68
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3	40.3	36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2	38.3
% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0	26.1	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0	10.3
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0	8.7	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0	39.7
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0	39.1	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0	45.6
% sconosciuti al Sert	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0	43.5	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0	60.3

**Tab.44 – Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta\*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2019.**

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	2188	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	1992	1398	1468
% <18 anni	3.4	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	2.3	3.6	2.3
% 18-29 anni	22.8	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	11.8	31.3	28.5
% 30-39 anni	17.8	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	14.2	22.2	21.7
% 40-49 anni	24.0	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	16.2	23.4	21.2
% 50-59 anni	18.3	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	9.5	11.1	14.8
% =>60 anni	12.3	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	6.1	7.1	8.6
% Non noto	1.4	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	40.0	1.4	2.9
Età media	42.0	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	26.8	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.1	27.0	26.4
% Non nativi	40.1	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.8	43.5	35.4
% Non residenti in area metropolitana	37.2	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.1	38.6
% Arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	64.9	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.7	67.2
% Arrivo nel week end	46.9	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.0	23.6	50.5
% Forze dell'ordine	0.9	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	5.0	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.1	2.2
% Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	11.0	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	7.5	7.8	5.6

\* Keywords: “abuso” & “alcol”; “abuso” & “alcool”; “abuso” & “etili”; “abuso” & “etanolic”; “intossicazione” & “alcol”;

“intossicazione” & “alcool”; “intossicazione” & “etili”; “esotossicosi etili”; “esotossicosi alc”

Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in European Journal of Emergency Medicine, 2011 Aug;18(4):208-14

## **Metodologia utilizzata: note**

**Definizione di caso** – Come “consumatori problematici” (CP) sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Come giocatori problematici sono stati considerati gli utenti dei SERD con diagnosi di gioco problematico (GP). I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERD e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Centri Territoriali di Salute Mentale (cartella informatizzata SIT), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna<sup>1</sup> (sistema informativo AREAS), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera - SDO), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT- codici ICD 10 F11, F14, F19, X42). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2019, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

**Materiali e metodi** - Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi ed essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti per la prima volta nell’anno considerato, e mai contattati negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero). Relativamente alle tabelle 15 e 29 (accessi ai reparti di Pronto Soccorso) i casi incidenti sono stati marchiati in modo univoco con una chiave anonima.

**Analisi** - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A\*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate<sup>2</sup>; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppiodi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono state calcolate per i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente\*1000). La popolazione residente (nativi e non nativi) è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna<sup>3</sup>.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 18.0 e STATA 15.0.

---

<sup>1</sup>Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46. Pavarin RM, (2015) Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse vol 50 pg 1690-1696

<sup>2</sup>Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

<sup>3</sup><https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service>